

PROCEDURALE ANALGOSEDATIE SPOED UZ: **MINIMALISEER NIET & GEBRUIK NOOIT GEFORCEERDE IMMOBILISATIE**

STAP1 OVERWEEG:

- Is de procedure *nodig*?
- onmiddellijk of uitstelbaar?
- *op spoed of eerder op OK?*
- Verwacht je *pijn*?
- Verwacht je *angst*?

= **VROEGTIJDIG ANALGOSEDATIE**

STAP2 VOORAF:

- Zorg voor *afleiding*?
- Voldoende *geruststelling & uitleg* aan patient & familie
- *Informed consent* waar nodig (bv. Ketofol)
- Specifiek uitleg extra kost bv. LATgel, Rapydan

- LATgel of EMLA kunnen reeds aangebracht worden na triage, Rapydan gebeurt best door diegene die de procedure zal doen

IFV VERWACHTE MOEILIKHEID, PIJN E/O ANGST

- <2maand: G30%+tutje
- **PERIFEEER INFUUS < 3J:** *EMLA +/- MIDAZ* (overweeg Veinviewer)
- **PERIFEEER INFUUS > 3J:** *EMLA of ROPYDAN +/- NO +/- MIDAZ* (overweeg Veinviewer)

- **CENTRALE LIJN – ART. LIJN:**
LOKAAL +/- KETALAR of KETOFOFOL
- **INTRAOSSEUS:**
(LOKAAL +/-) XYLO IV ALVORENS FLUSH

- **LUMBAALPUNCTIE:** *EMLA +/- MIDAZ*

- **LACERATIE:**
LAT (+/- LOKAAL) +/- NO +/- MIDAZ
- **LUXATIE/FRACTUURREDUCTIE – TRACTIE – ABCES – WONDDEBRIDERING:**
KETALAR of KETOFOFOL
(BEPERKT: FENTA +/- MIDAZ)

- **NIET PIJNLIJK BV. BLAASSONDE, VREEMD VOORWERP, BEELDVORMING..:**
MIDAZ of PROPOFOL

BLIJF HET EFFECT VAN DE ANALGOSEDATIE CONTINU EVALUEREN VOOR, TIJDENS EN OOK NA PROCEDURE

- **LAT GEL:** 0.5-1ML PER CM WONDLENGTE, MAX 2 ML (1-3J) – 3ML (>3ML); MAX 5CM WONDE ZIE PROCEDURE; **NIET** < 1J; SLIJMVLIES; TOPPEN (VINGER, TEEN, GENITAAL, NEUS, OREN). EVT LOKAAL BIJVERDOVEN. PROCEDURE < 15' NA VERWIJDEREN.
- **EMLA:** AANBRENG ASAP; MIN 60' TER PLAATSE, NA VERWIJDEREN WACHTEN TOT HUID TERUG ROZE, VERDOOFT 2MM DIEP
- **ROPYDAN:** AANBRENG DOOR PRIKKER; PLEISTER NIET KNIPPEN, WERKT NA ONGEVEER 30' EN TOT 2U NA, 6MM DIEP; MAX 2 PLEISTERS /24U; ENKEL OUDER DAN 3J

- **LOKAAL: LINISOL** (XYLO 1% 10MG/ML + ADRE) **0.5-1** MG/KG (MAX. 7MG/KG OF ADULT 200 MG/24U); LATENTIE 5-15'; VERMIJD ADRENALINE BIJ DISTALE ZONES (VINGERTOP, NEUS, PENIS... BUFFER MET NABIC 8.4% (10 ML LINISOL MET 1ML NABIC)
- **XYLO INTRAOSSEUS:** 0.5 MG/KG XYLO (ZONDER ADRENALINE, 2%=20MG/ML) OVER 1-2' ; WACHT 60" ALVORENS TE FLUSHEN

- **MEOPA** (EQUIMOLAIR MENGSEL **NO/O2**): ZIE PROCEDURE iPROVA – max 45' – niet als hevige pijn – hoge zuurstofnood...

- **MIDAZOLAM:** ANXIOLYSE/AMNESIE; KAN IV 0.1MG/KG, IM 0.2MG/KG (ADULT 5 MG); KAN OOK NASAAL (MAD DEVICE, WEL IRRITEREND) 0.3-0.5MG/KG OF PER OS 0.3-0.5MG/KG (IN APPELSAP OF COLA, WERKT NA 20' ONGEVEER)
- **FENTANYL:** IV 1 MCG/KG GETITREERD (URGENTIEARTS); NASAAL 1.5 MCG/KG (MAD DEVICE; zie iPROVA voor staand order 178)
- **KETALAR:** IV GETITREERD (URGENTIEARTS); STEEDS TE ASSOCIEREN MET MIDAZOLAM (+ ATROPINE) OF PROPOFOL (ZIE KETOFOFOL); KAN OOK INTRANASAAL/IM (1mg/kg pijnstillend – 9mg/kg sedatief)
- **PROPOFOL:** IV GETITREERD (URGENTIEARTS); CAVE: HD IMPACT, NIET ANALGETISCH
- **KETOFOFOL:** 1ml (50mg) Ketalar + 20ml (200 mg) Propofol; 0.05-0.1 ml/kg; getitreerd. ZIE PROCEDURE (URGENTIEARTS); ONDER MONITORING