


## استخدام جرعة البخاخة مع كمامة الاستنشاق

معلومات " انقر فوق مزيد من المعلومات حول موضوع "استنشاق الفيديو - [www.bvp-sbp.org](http://www.bvp-sbp.org)

دائماً استخدام غرفة الاستنشاق. يجب عدم إعطاء النفخة مباشرة في الفم



قم بإزالة الغطاء الواقي  
رج العبوة جيداً قبل الاستخدام  
أوصل البخاخ بالكمامة  
يجب عليك أن تنفخ مرتين في كمامة الاستنشاق عند أول استخدام أو بعد التنظيف  
قبل الاستخدام اطلب من طفلك الجلوس بشكل مستقيم مع رفع الذقن قليلاً  
ضع الكمامة مع القناع على فم طفلك وأنفه (إذا لم يكن هناك قناع ، ضع بوق الفم في الفم. يجب أن تحيط الشفاه والأسنان  
بوق الفم تماماً)  
ادفع النفخة مرة واحدة  
اسمح لطفلك بالتنفس والخروج 10 مرات بهدوء. يجب أن يتحرك الصمام دائماً  
عندما تستخدم لطفل أكبر: دعه أولاً يقوم بالزفير، و ثم يقوم بأخذ شهيق عميق بهدوء  
إذا كان طفلك بحاجة إلى مرة إضافية ، فيجب تكرار الإجراء بأكمله (لا تكرر العملية مرتين متتاليتين في نفس الوقت في  
الكمامة)  
اشطف الفم بعد الاستعمال (لا تشرب)


إذا لزم الأمر: أول إعطاء الدواء اللازم ، بعد 10 دقائق يعطي دواء الوقاية  
(Flixotide © ، Seretide © ، Fluticasone © ،...)

## تنظيف غرفة الاستنشاق

اغسل الكمامة في ماء دافئ باستخدام المنظفات. لا تضعها او تغرقها في الماء، تدعها تجف في الهواء. لا تجففها بسرعة.  
استخدم الكمامة مرة أخرى عندما تكون جافة تماماً، تكرر عملية التنظيف: 1 × / أسبوع

## كيفية التحقق مما إذا كان جهاز الاستنشاق فارغاً تقريباً؟

أفضل طريقة للتحقق من ذلك هي إزالة العلبة من حامل البلاستيك ووضعها في وعاء من الماء. كلما قل عدد الجرعات التي يحتويها الجهاز ، كلما زادت نسبة الهواء الذي يحتويه



### نظرة عامة (يقوم الطبيب بتعبئتها)

دواء	الجرعة الدوائية في حالات
الدواء الرئيسي	السعال، الصفير، ضيق التنفس ، نزلة برد ، في حالة الجهد
العلاج المحافظ او المدعم و الواقي	جميع الايام (أيضا في بداية الدواء)

### التخلص التدريجي من دواء سالبوتامول / فينتولين

..... من ... / ... / ... إلى ... / ... / ... كل ساعة

..... من ... / ... / ... إلى ... / ... / ... كل ساعة

..... من ... / ... / ... إلى ... / ... / ... كل ساعة

من ... / ... / ..... توقف عن النفخ

إذا كان طفلك يتلقى العلاج المحافظ او المدعم و الواقي ، فلا يمكنك إيقافه بنفسك. دائما استشر طبيبك

### في حالة وجود مشكلة

إذا كان طفلك يعاني من انسداد ، فيجب عليه أن ينفخ مع الدواء مرة أخرى. هذا ممكن أيضاً إذا كان طفلك يعاني مرة أخرى من المتاعب في المستقبل. استشر الطبيب في أقرب وقت ممكن ، ما لم يتفق على خلاف ذلك

وهذا يعني أن الرعاية الصحية تهدف إلى . يقدم قسم طب الأطفال في مستشفى جنت الجامعي رعاية من الدرجة الثالثة إذا احتاج طفلك إلى الدخول ، فقد نقوم بترتيب . اضطرابات معقدة وبالتالي ، فإن عدد أماكن الدخول إلى مستشفى الأطفال محدود طبيب الأطفال الذي يمكنه مراقبة طفلك وإرساله / هذا هو السبب في أننا نوصي باختيار طبيبك العام . الدخول إلى مستشفى آخر إلينا إذا لزم الأمر

## للأسئلة العاجلة

33 332 27 42 :هاتف :قسم الطوارئ مستشفى جنت الجامعي  
33 332 09 :هاتف :طبيب الأطفال مستشفى جنت الجامعي تحت الطلب  
إذا كنت بحاجة ماسة إلى المساعدة الطبية ، فأنت تأتي إلى قسم الطوارئ  
112 إذا كنت بحاجة إلى رعاية طبية على الفور ، فاتصل بالرقم  
هذه المعلومات لا تحل محل الاستشارة مع الطبيب وتتوفر أيضاً بلغات أخرى