

SPOEDGEVALLENDIENST

contact
Tel. 09 332 27 42


datum
20/05/2019

pagina
1/2

1 Een dosisaerosol met voorzetskamer gebruiken

Info: www.bvp-sbp.org – klik verder op topic 'inhalatievideo's'

Gebruik steeds een voorzetskamer. De puff mag niet rechtstreeks in de mond toegediend worden.



- Verwijder het beschermkapje.
- Schud de puff goed voor gebruik.
- Plaats de puffer op de voorzetskamer.
- Bij het allereerste gebruik of na het reinigen moet je twee keer in de voorzetskamer puffen vóór gebruik.
- Laat je kind rechtop zitten met de kin iets naar omhoog.
- Plaats de voorzetskamer met het masker over de mond en neus van je kind (als er geen masker is, plaats het mondstuk dan in de mond. De lippen en tanden moeten het mondstuk volledig omsluiten).
- Duw eenmaal op de puff.
- Laat je kind 10 keer rustig in- en uitademen. De klep moet telkens bewegen. Bij gebruik voor een groter kind: uitademen, mondstuk in de mond en rustig maar diep inademen.
- Als je kind 2 puffs moet krijgen, moet de hele procedure herhaald worden (geen 2 puffs tegelijk in de voorzetskamer).
- Mond spoelen na gebruik (niet drinken).


Indien noodzakelijk: eerst aanvalsmedicatie (Salbutamol/Ventolin) toedienen, na 10 minuten onderhoudsmedicatie (Flixotide®, Seretide®, Fluticason®, ...).

2 De voorzetskamer reinigen

Was de voorzetskamer in warm water met detergent. Spoel NIET af, maar laat drogen aan de lucht. NIET afdrogen. Gebruik pas opnieuw als de voorzetskamer helemaal droog is. Frequentie: 1 x / week

3 Hoe controleren of de inhalator bijna leeg is?

Je controleert dit het best door het spuitbusje uit de plastic houder te nemen en in een bakje water te leggen. Hoe minder dosissen het spuitbusje bevat, hoe meer lucht erin zit en hoe meer het zal stijgen.



4 Overzicht (in te vullen door de arts)

Medicatie	Dosis
Aanvalsmedicatie	Hoesten, piepen, kortademigheid, beginnende verkoudheid, voor inspanning
Onderhoudsbehandeling	Alle dagen (ook bij start aanvalsmedicatie)

5 Afbouw van de aanvalsmedicatie Salbutamol/Ventolin® puffs

Van .../.../..... tot .../.../..... elke uur puffs

Van .../.../..... tot .../.../..... elke uur puffs

Van .../.../..... tot .../.../..... elke uur puffs

Vanaf .../.../..... stop puffen

Als je kind onderhoudsmedicatie (Flixotide®, Seretide®, Fluticason®, ...) krijgt, mag je die NOOIT zelf stopzetten. Overleg altijd met je arts.

6 Bij benauwdheid

Als je kind het benauwd heeft, moet het opnieuw vaak puffen met de aanvalsmedicatie (Salbutamol/Ventolin®). Dit mag ook wanneer je kind in de toekomst opnieuw last krijgt van benauwdheid. Raadpleeg wel zo snel mogelijk een arts, tenzij anders afgesproken.

7 Contact

De dienst Kindergeneeskunde van het UZ Gent biedt derdelijnszorg. Dit betekent dat de zorg gericht is op complexe aandoeningen. Het aantal plaatsen voor opname in het Kinderziekenhuis is dus beperkt. Als je kind moet opgenomen worden, kan het zijn dat we een opname regelen in een ander ziekenhuis. Daarom raden we je aan om een eigen huisarts/kinderarts te kiezen die je kind kan opvolgen en naar ons kan doorsturen als dat nodig is.

Bij dringende vragen:

- Spoedgevallendienst UZ Gent: tel. 09 332 27 42
- Kinderarts van wacht UZ Gent: tel. 09 332 35 15

Als je **dringend** medische hulp nodig hebt, kom je naar de Spoedgevallendienst.

Als je **onmiddellijk** medische hulp nodig hebt, bel je het nummer 112.

Deze informatie vervangt geen consultatie bij een arts en is ook in andere talen te verkrijgen.