



**Contra-indicaties voor éénmalige toediening van NSAID:**

- > Allergie voor NSAID of acetylsalicylzuur
- > Reeds max. dosis NSAID ingenomen
- > Actieve GI bloeding, symptomatisch maagulcus, GI perforatie of obstructie
- > Gekende verergering van de klachten bij astma
- > Ernstig hartfalen en vaatziekten
- > Ernstig leverlijden (levertesten >3x normaalwaarden en albumine <2.5 g/dl)
- > Nierinsufficiëntie+dehydratie?

**Contra-indicaties voor toediening van paracetamol:**

- > Reeds inname van >4 g paracetamol laatste 24 u
- > Gekend leverlijden
- > Allergie voor paracetamol

**Contra-indicaties voor tradonal**

- > Epilepsie
- > Allergie

**Contra-indicaties voor opiaten**

- > Gekende allergie

\*criteria voor PO of IV toediening:

Heelkunde voorzien, Gastro-intestinale problemen, Reeds IV toegang

**Pijnprotocol enkel toe te passen vanaf de leeftijd van 15 jaar**

\*steeds na overleg met arts!

\*Overweeg IV:  
Morfine 0.05-0.2 mg/kg  
Fentanyl 1-2 mcg/kg  
Piritramide 0.1-0.2 mg/kg