

Ambulante (via dringende opname) farmacologische cardioversie bij paroxismale atriale fibrillatie

-Spoedopname, hartbewaking


-Hemodynamisch stabiele patiënten (Systolische bloeddruk >100mmHg)

-Recent ontstaan (≤7 dagen)

-Indien > 48 uur bezig: adequate therapeutische anticoagulatie

• **Afwezigheid van:**

- structureel hartlijden
- coronair lijden



IV Flecaïnide (Tambocor®)

- 1.5-2mg/kg over 10 min

• **Niet in aanmerking komend voor Flecaïnide**

en < 48 uur bezig:

- Coronair lijden
- Mild tot matig hartfalen (pEF en rEF): NYHA I-II
- LV hypertrofie
- **En afwezigheid van :**
 - Ernstige aortaklepstenose
 - Andere AAR <4u
 - QTc >440msec
 - ACS
 - Conductieproblematiek
- Geen andere IV anti-aritmica <24 uur
- Zeker ontslag zelfde dag van opname



IV Vernakalant (Brinavess®)

- 3mg/kg over 10 min (max 339mg)
- Als na 15 min niet sinusaal: 2mg/kg /10 min

Afkortingen:

-NYHA: New York Heart Association

-pEF: preserved ejection fraction

-rEF: reduced ejection fraction

-LV: linkerventrikel

-AAR: anti aritmica

-u: uur

-QTc: gecorrigeerd QT interval

-ACS: Acuut coronair syndroom

-mg: milligram

-kg: kilogram

-min: minuten