



Gifslangenbeet

Spoedgevallendienst procedure	Versie 1.0 / Datum van opmaak : 18-01-06
Trefwoorden : gifslang, slangenbeet	Toepassingsgebied : - alle patiënten die gebeten werden door een gifslang

Algemene regels.

- 95% van de slangenbeten gebeurt op de extremiteiten.
- Het gif wordt normaal subcutaan geïnoculeerd en verspreidt vlug lokaal.
- Het gif wordt voor het overgrote deel getransporteerd via de lymfevaten (niet via bloedvaten).
- Incisie en excisie nemen slechts een geringe hoeveelheid gif weg.
- Immobilisatie en druk op de plaats van de beet remmen effectief de verspreiding van het gif.

Eerste hulp

- Ziekenhuis (100 dienst) verwittigen – MUG.
- Onmiddellijk een stevig drukverband over de gebeten plaats en liefst over de ganse lengte van het lidmaat.
- Immobilisatie (onbeweeglijk houden) van het getroffen lidmaat.
- Slachtoffer geruststellen (slechts een klein percentage verloopt fataal).
- De arteriën van het lidmaat niet afsnoeren.
- Aangekomen in het ziekenhuis, onmiddellijk het antigifcentrum contacteren (070/245.245).

Data.

Ontwikkeld door : spoedgevallendienst + Dr. Schelstraete, anesthesist, AZ Leiden