



PIPAC

VERNEVELING VAN CHEMOTHERAPIE
IN DE BUIKHOLTE

INHOUD

01	Inleiding	4
02	Behandeling met PIPAC	4
03	Verloop van de behandeling	9
04	Kosten	9

01 INLEIDING

U wordt behandeld voor buikvlieskanker of carcinomatose. Deze carcinomatose kan niet chirurgisch verwijderd worden en wordt gewoonlijk behandeld door toediening van chemotherapie in de ader.

Recent werd een nieuwe behandeling ontwikkeld voor carcinomatose die niet chirurgisch kan verwijderd worden: PIPAC (Pressurized IntraPeritoneal Aerosol Chemotherapy of intraperitoneale toediening van aerosolchemotherapie onder verhoogde druk). Deze techniek werd intussen bij meer dan 125 patiënten in het UZ Gent toegepast en heeft weinig bijwerkingen. Na de PIPAC kan wel tijdelijk een beperkte lever- en niertoxiciteit optreden. U kunt ook last hebben van misselijkheid, een vertraagde darmwerking en koorts.

02 BEHANDELING MET PIPAC

Tijdens de PIPAC-behandeling wordt vloeibare chemotherapie met een pomp onder hoge druk omgezet naar een aerosol. Het type chemotherapie dat in de buik wordt toegediend, is afhankelijk van het type kanker (bv. eierstokkanker, dikdarmkanker, ...).

GEÏNFORMEERDE TOESTEMMING VOLWASSENE

De ondertekende patiënt: _____ Geboortedatum patiënt: <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/>	ADREMA
--	---------------

Ik verklaar dat ik door _____ geïnfomeerd ben over volgende ingreep/medische procedure: _____

Ik begrijp dat bij een dringende medische noodzaak de arts die op dat moment verantwoordelijk is, kan beslissen om een andere ingreep of procedure uit te voeren.

Getieve de vakjes onderaan aan te vinken als u akkoord gaat:

- Mijn behandelende arts of een lid van het behandelende team heeft me in begrijpelijke taal uitgelegd:
- welke ingreep/medische procedure ik zal ondergaan
 - waarom de ingreep/medische procedure nodig is
 - hoelang de ingreep/medische procedure ongeveer zal duren
 - hoeveel keer ik de ingreep/medische procedure zal moeten ondergaan (indien meerdere noodzakelijk zijn)
 - of er tegenaanwijzingen zijn
 - wat de mogelijke complicaties zijn
 - welke risico's eraan verbonden zijn
 - of verdooving noodzakelijk is
 - welke nazorg nodig zal zijn
 - wat mogelijke alternatieven zijn
 - welke pijnkachten kunnen optreden.

- Ik kreeg de kans om hierover vragen te stellen en mijn vragen zijn voldoende beantwoord.
- Ik weet dat ik voor informatie over de kosten van de ingreep/medische procedure en financiële gevolgen altijd terecht kan op het Patiënteninformatiebureau. Locatie: ingang 75, gelijkvloers, route 7500 | ingang 12, gelijkvloers, route 1201
- Ik stem in met een bloedtransfusie als mijn behandelende arts ze noodzakelijk acht.

Op basis van de verkregen informatie en zonder enige vorm van beïnvloeding beslis ik om de eerdergenoemde ingreep/medische procedure te laten uitvoeren.

Gelezen en goedgekeurd (gelieve na te schrijven): _____

Datum: ____ / ____ / ____

Handtekening: _____

De behandelende arts

Ik verklaar dat ik bovenstaande patiënt in een persoonlijk gesprek en in begrijpbare taal heb geïnformeerd over de ingreep/medische procedure die hij/zij zal ondergaan.

Datum: ____ / ____ / ____

Handtekening: _____



UNIVERSITEIT
GENT

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

www.uzgent.be

03 VERLOOP VAN DE BEHANDELING

- ▲ U wordt onder algemene verdoving gebracht.
- ▲ Tijdens de kijkoperatie wordt eerst de uitbreiding van de ziekte in de buik beoordeeld en worden enkele stalen van de tumor genomen voor microscopisch onderzoek. Als we uw buik onvoldoende kunnen beoordelen als gevolg van vergroeiingen, wordt de insnede in de buik verlengd. Dankzij de aerosol verspreidt de chemotherapie zich homogeen in de buik. Door de verhoogde druk kan de chemotherapie dieper in de tumoren doordringen waardoor de ziekte beter gestabiliseerd kan worden.
- ▲ De chemotherapie-toediening duurt 30 minuten. De hele procedure duurt ongeveer 90 minuten.
- ▲ Na de ingreep gaat u naar de ontwaakzaal.
- ▲ In de loop van de dag mag u de ontwaakzaal verlaten en gaat u naar de kamer. De procedure kan in dagopname gebeuren of u kunt enkele dagen in het ziekenhuis opgenomen worden.
- ▲ Na de operatie moet u één week lang vermijden dat anderen in contact komen met uw lichaamsvochten. Spoel daarom het toilet door met gesloten deksel, vervang wondverbandjes met steriele handschoenen, enz.
- ▲ Als u ook chemotherapie via de ader krijgt, kan uw oncoloog die na uw ontslag terug opstarten. Dit kan na ongeveer 1 week.
- ▲ Na 3 PIPAC-toedieningen maken we een scan van uw buik en meten we de tumormarker in het bloed. Op basis daarvan evalueren we hoe uw ziekte op de behandeling reageert. Als de tumor niet verder uitgebreid is in vergelijking met vorige scans, kunnen we de PIPAC-behandeling drie keer herhalen. Gewoonlijk zitten er 6 weken tussen de opeenvolgende PIPAC-behandelingen.

04 KOSTEN

PIPAC is momenteel geen terugbetaalde behandeling in België. De kosten voor het chirurgisch materiaal worden grotendeels terugbetaald, met uitzondering van de vernevelaar. Die kost nu 2046,72 euro inclusief BTW per procedure. Dat betekent dat u uw hospitalisatieverzekering moet contacteren met het verzoek om hiervoor betaling te voorzien.

Dienst Gastro-intestinale heekunde

Ingang 12, route 1275

Dr. Wouter Willaert

T +32 (0)9 332 89 50

wouter.willaert@ugent.be

Prof. dr. Wim Ceelen

T +32 (0)9 332 62 51

wim.ceelen@ugent.be

Afspraken: poli BAS

Ingang 12, route 1325

T +32 (0)9 332 95 00

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

