

Oralair® is een vorm van immunotherapie voor volwassenen en kinderen boven de vijf jaar die overgevoelig zijn aan graspollen. De tabletten bevatten een mengsel van verschillende graspollen dat overeenkomt met de natuurlijke blootstelling. Het doel van de behandeling is het lichaam tolerant maken voor het allergeen. Oralair® wordt onder de tong (= sublinguaal) toegediend

Start en duur van de behandeling

De behandeling begint ongeveer vier maanden voor het graspollenseizoen. Meestal starten we in februari.

De eerste tablet neemt u in onder toezicht van een arts. Zo kan die mogelijke bijwerkingen onmiddellijk met u bespreken.

De totale behandeling duurt drie jaar (met 5 à 6 maanden effectieve behandeling per jaar).

U komt elk jaar in de maanden juni of juli op controle bij prof. dr. Philippe Gevaert of dr. Julie Willekens. U krijgt dan ook de voorschriften voor de verdere behandeling.

Dosering en inname

De dosering van een tablet is hetzelfde voor volwassenen, kinderen en adolescenten.

We starten altijd met een startverpakking voor de eerste maand van de behandeling. Die bevat twee blisters. Een kleine blister met 3 tabletten 100 IR (om te starten) en een grote blister met 28 tabletten 300 IR.

Doseerschema

Kleine blister instelfase

- ▲ Dag 1: 1 tablet 100 IR (onder toezicht arts)
- ▲ Dag 2: 2 tabletten 100 IR

Grote blister onderhoudsfase

- ▲ Dag 3 en verder: 1 tablet 300 IR

Inname

Na een instelfase van drie dagen waarbij de allergeendosis wordt verhoogd, neemt u elke dag één tablet van 300 IR tot het einde van het graspollenseizoen.

Neem de tablet bij voorkeur 's morgens. Zorg ervoor dat uw mond leeg is en leg de tablet onder uw tong. Laat de tablet volledig oplossen en slik dan door.

Tablet vergeten innemen?

Als de behandeling minder dan één week werd onderbroken, kunt u ze zonder aanpassingen opnieuw opstarten. Vergat u de tabletten langer dan één week in te nemen, dan moet de behandeling onder toezicht van een arts herstart worden.

Zwangerschap en borstvoeding

We raden aan om niet met immunotherapie te starten als u zwanger bent. Als u borstvoeding wil geven terwijl u in behandeling bent, moet u dat met uw arts bespreken.

Mogelijke bijwerkingen

De meeste bijwerkingen zijn mild (keelpijn, hoofdpijn, jeuk in de mond) of matig van aard. Slechts zelden treden ernstige bijwerkingen op zoals zwelling in de keel, moeite met slikken of ademen. Neem in dat geval onmiddellijk contact op met een arts. De behandeling moet dan stopgezet worden.

Tijdelijke stopzetting van de behandeling

Uw dokter kan beslissen om de behandeling een tijdje te onderbreken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij bepaalde bijwerkingen, infectie met hoge koorts, mondwonden (tanden, aften) of een astma-aanval.

Prijs

De prijs voor 30 tabletten bedraagt 92,80 euro. Voor 90 tabletten is dat 258,01 euro.

Afspraak voor eerste inname

Polikliniek Neus-, keel- en oorheelkunde

routes 690 (balie) en 700 (allergielokaal)
Aanmelden aan aanmeldzuilen (ingang 50)

Polikliniek Kindergeneeskunde

Ingang 10, route 1002
Aanmelden aan aanmeldzuilen (ingang 12)