

UW CONDITIONERING MET MELFALAN

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE

01	Wat houdt een conditionering met Melfalan in?	3
02	Vorbereiding en verloop van de conditionering	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Bijwerkingen	4

01 WAT HOUDT EEN CONDITIONERING MET MELFALAN IN?

Het vervolg van uw behandeling voor multiple myeloom is de toediening van hoge dosis Melfalan met direct daaropvolgend een autologe stamceltransplantatie.

Bij een autologe stamceltransplantatie krijgt u uw vooraf verzamelde stamcellen terug na de toediening van uw chemotherapie. Deze voorbehandeling wordt de conditionering genoemd.

De soort conditionering hangt af van de onderliggende ziekte. Bij u wordt gekozen voor het Melfalan-schema.

De hoge dosis chemotherapie werkt in tegen de myeloomcellen, maar zal ook uw gezond beenmerg beschadigen. De toegediende stamcellen hebben als doel uw beenmerg en bloedaanmaak te herstellen.

Generische naam	Vb. Specialiteitsnaam	Specifieke werking
Melfalan	Alkeran®	Cytostatica

02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE CONDITIONERING

Indien u vóór de opname nog geen centrale katheter of poortkatheter heeft, wordt er bij het begin van de opname een centrale katheter geplaatst.

Via deze weg kunnen chemotherapie, vocht, voeding, ... en de stamcellen worden toegediend.

Op dag 2 van uw opname zal gestart worden met de conditionering. Een gedetailleerd schema van uw conditionering vindt u op de volgende pagina. Het cytostaticum zal intraveneus (via het infuus) worden toegediend. Gedurende uw opname zal u ook veel vocht toegediend krijgen via het infuus om schade t.h.v. de nieren te voorkomen.

Om ontstekingen in de mond te voorkomen zal uw verpleegkundige voor, tijdens en na de toediening van Melfalan u een waterijsje en/of ijsblokjes aanbieden.

Na het einde van de conditionering volgt een dag rust. Nadien worden uw stamcellen ontdooid en via een infuus toegediend.

03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

Product	Toediening	Dag van opname	Dag 1	Dag 2	Dag 3
Melfalan	IV (intraveneus)		X		
Stamcelinfusie	IV				X

04 BIJWERKINGEN

De bijwerkingen die bij een conditionering met Melfalan het meest voorkomen zijn:

- Beschadiging van het beenmerg. Hierdoor zal het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes fors dalen. Dit heeft bloedarmoede tot gevolg, maar ook een verhoogde gevoeligheid voor infecties en een verhoogde bloedingsneiging.
- Misselijkheid en braken
- Verminderde eetlust
- Haarverlies
- Vermoeidheid
- Wijzigingen in uw stoelgangpatroon
- Ontstekingen van de slijmvliezen van de mond, slokdarm, maag en darmen (mucositis)

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is zeer individueel en persoonlijk! Iedereen reageert anders op de toediening.

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen hebben er minder last van. Belangrijk hierbij is dat de ernst van de bijwerkingen niets te maken heeft met het resultaat van de behandeling!

Het is belangrijk dat u steeds uw bijwerkingen vermeldt aan uw arts of verpleegkundige. Op die manier kunnen er mogelijkheden gezocht worden om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.
