

Je kreeg bij ons:

- **Inspuiting met Engerix B®**
Preventie van hepatitis B
- **Azithromycine® (2 x 500mg)**
Preventie en behandeling chlamydia en gonorroe
- **Doxycycline® (startdosis van 200 mg)**
Preventie en behandeling van chlamydia
Opvolgdosis van 100 mg 2x daags gedurende 7 dagen
- **Inspuiting met Ceftriaxone®**
Preventie en behandeling gonorroe
-
-
-
-

Gebruik tot aan de definitieve SOA-test 1 maand na de feiten altijd een condoom bij seksuele contacten.

v.u.: Frank Vermassen, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – september 2025 – Versie 04 – Art. 090030

Zorgcentrum na Seksueel Geweld

Ingang 26C
T +32 (0)9 332 80 80
E zsg@uzgent.be
<https://zsg.belgium.be>
www.uzgent.be/zsg

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN

PREVENTIEVE
BEHANDELING

SEKSUEEL OVERDRAAGBARE AANDOENINGEN

Seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) kunnen bij iedereen voorkomen na seksueel contact met een besmet persoon.

Een soa hoeft niet altijd klachten te veroorzaken. In deze brochure bespreken we enkele frequent voorkomende soa's.

De beste bescherming tegen soa's is een condoom gebruiken bij elk seksueel contact.

Hepatitis B

Wat?

De ziekte is overdraagbaar via seksueel contact en/of bloedcontact. Een vaccinatie kan een besmetting voorkomen.

Het hepatitis B-virus kan de lever ernstig aantasten. Een gelige huid, koorts en vermoeidheid zijn de eerste symptomen.

Behandeling

Werd je als kind gevaccineerd, dan kijken we via een bloedafname of het vaccin je voldoende beschermt tegen besmetting. Als dat niet het geval is, geven we je een herhalingsdosis van het vaccin Engerix-B®. Dat gebeurt via een inspuiting in de spier van je bovenarm.

Werd je nooit gevaccineerd tegen hepatitis B, dan krijg je 3 inspuitingen met Engerix-B®. De eerste inspuiting krijg je in het ZSG. Voor de tweede en derde inspuiting verwijzen we je naar je huisarts.

De meeste mensen hebben weinig klachten van het vaccin. Pijn aan de inspuitingsplaats, een moe of ziek gevoel zijn normaal.

Chlamydia en gonorroe

Wat?

Chlamydia en gonorroe zijn veel voorkomende seksueel overdraagbare aandoeningen in België. Ze kunnen bij iedereen voorkomen, maar zijn meer frequent bij jong-volwassenen. Chlamydia en gonorroe kunnen zowel vaginaal, oraal als anaal worden overgedragen.

Afhankelijk van het type seksueel contact kunnen de symptomen uiteenlopend zijn.

Soms merken mensen niet op dat ze besmet zijn. Het is dus belangrijk om de behandeling zo snel mogelijk op te starten. Op lange termijn kunnen deze infecties zowel bij vrouwen als mannen tot onvruchtbaarheid leiden.

Behandeling

Chlamydia en gonorroe zijn te behandelen met antibiotica. Indien nodig wordt een verdere opvolging met je besproken.

Afhankelijk van de risico-inschatting worden tabletten azitromycine, doxycycline en/of een inspuiting ceftriaxon gegeven. Mogelijke bijwerkingen zijn pijn aan de inspuitingsplaats, misselijkheid en diarree.

Sekspartner(s)

Tot 7 dagen na de behandeling is het beter om geen seks te hebben, of in elk geval een condoom te gebruiken.

Chlamydia en gonorroe zijn heel besmettelijk. Als je een vaste relatie hebt, gaan we ervan uit dat je partner waarschijnlijk ook besmet is. Die kan zich meteen laten

testen of behandelen bij de huisarts. Zo niet, kan je bij het volgend seksueel contact opnieuw besmet worden.

Omdat chlamydia en gonorroe erg besmettelijk zijn, licht je best alle seksuele contacten van de voorbije twee maanden in. Dat kan ook anoniem via www.partneralert.be. Het ZSG kan je hierbij helpen.

Hiv

Bij de opstart van preventieve hiv-medicatie kreeg je een afzonderlijke folder. Je wordt dan verder opgevolgd op de dienst Algemene inwendige ziekten en Infectieziekten van ons ziekenhuis.

Opnieuw testen

Je kreeg een eerste soa-test in het ZSG. Dit is geen definitieve test en dit betekent niet dat je soa-vrij bent. Een hertest kan dus nodig zijn, op het ZSG of bij je huisarts.

Als je nog vragen hebt, kan je contact opnemen met het Zorgcentrum na Seksueel Geweld.

Nuttige links

www.sensoa.be

www.allesoverseks.be