



Polikliniek BAS

Ingang 12, route 1325
T +32 (0)9 332 95 00
polibas.afspraken@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veele-
voudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

BIFITERAL®

GEBRUIK BIJ HEPATISCHE ENCEFALOPATHIE (HE)

www.uzgent.be

Volg ons op



Wat is hepatische encefalopathie?

Hepatische encefalopathie is verwardheid of sufheid die kan ontstaan als complicatie bij gevorderde levercirrose. De lever breekt dan de giftige afvalstoffen die in de darm worden gevormd niet meer af (o.a. ammoniak). De klachten bij hepatische encefalopathie kunnen zowel geleidelijk als plots ontstaan. Soms raakt de patiënt door de aandoening in coma.

Wat is Bifiteral®?

Bifiteral® of lactulose is een laxeermiddel dat we gebruiken om hepatische encefalopathie te behandelen. Bifiteral® zorgt ervoor dat de toxische afvalstoffen het lichaam verlaten met de stoelgang en dus niet worden opgenomen in het bloed. Patiënten die Bifiteral® innemen zouden 2 tot 3 keer per dag zachte stoelgang moeten hebben. Het is heel belangrijk dat u Bifiteral® inneemt zoals uw arts het heeft voorgeschreven.

Wat te doen bij beginnende verwardheid bij levercirrose?

- ▲ Neem een extra dosis Bifiteral® in om de uitscheiding van afvalstoffen te bevorderen.
- ▲ Neem contact op met uw huisarts of maak een afspraak op de polikliniek BAS.
- ▲ Bij ernstige klachten kan een ziekenhuisopname aangewezen zijn.

