

Bewaring

- ▲ Bewaar dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.
- ▲ Bewaar de **tabletten** op een droge plaats bij kamertemperatuur tot de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).
- ▲ Bewaar de **fles siroop** in de kartonnen buitenverpakking om ze te beschermen tegen het licht. De siroop bestaat uit een poeder dat u oplost met 123 ml water. Dat heeft een effect op de houdbaarheid:
 - Een gesloten fles is houdbaar tot de uiterste houdbaarheidsdatum (zie verpakking).
 - Als het mengsel opgelost is, is de fles nog 21 dagen houdbaar.

Verkrijgbaarheid

Linezolid is enkel verkrijgbaar met een voorschrift in de Apotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). De arts zal een terugbetalingsattest invullen en u meegeven. Om terugbetaling te krijgen is het belangrijk dat u dit attest aflevert in de ziekenhuisapothek. Zo niet staat u zelf in voor de volledige kostprijs: 588,23 euro (situatie juli 2020) voor een doos van 20 tabletten.

Openingsuren Apotheek UZ Gent

- ▲ Weekdagen: van 8 tot 20 uur
- ▲ Zaterdag: van 8 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
- ▲ Zondag: van 8 tot 13 uur
- ▲ Feestdagen:
 - Maandag, vrijdag of zaterdag: van 8 tot 17 uur
 - Dinsdag, woensdag, donderdag of zondag: van 8 tot 13 uur

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 09/0047 – Oktober 2020 – versie 1

Apotheek

Ingang 12, route 1570
T +32 (0)9 332 29 60

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



LINEZOLID



LINEZOLID

Linezolid is een antibioticum (o.a. verkrijgbaar onder de merknamen Zyvoxid® en Linezolid Sandoz®). Het wordt gebruikt om infecties te behandelen die het gevolg zijn van resistente bacteriën, waartegen andere antibiotica niet werken. De arts kan u linezolid voorschrijven bij bv. infecties van de huid, gewrichten en botten.

Inname

Om de infectie te overwinnen is het heel belangrijk dat u de tabletten of de siroop na uw ontslag uit het ziekenhuis verder inneemt zoals uw arts die heeft voorgeschreven.

Neem de voorgeschreven dosis:

- ▲ 2 maal per dag
- ▲ Steeds op dezelfde tijdstippen
- ▲ Met 12 uur tussentijd
- ▲ Met of zonder maaltijd



- Tablet:
 - 2 x 600 mg
 - om uur en uur



- Siroop:
 - 2 x mg = 2 x ml
 - om uur en uur

Een kuur duurt 2 weken. In zeldzame gevallen schrijft de arts dit antibioticum langer voor.


Stop de behandeling nooit op eigen initiatief.

Vergeten dosis

Neem de vergeten dosis zo snel mogelijk in. Wacht daarna 12 uur om een nieuwe tablet in te nemen. Blijf nadien uw dosis steeds om de 12 uur innemen. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen en voedingssupplementen kunnen de kans op bijwerkingen verhogen. Meld aan uw arts of apotheker steeds alle medicatie, voedings- en kruidensupplementen die u inneemt of wil innemen, ook producten die u zonder voorschrift kunt krijgen. Meld steeds aan andere zorgverleners dat u een behandeling met linezolid volgt.



Bijwerkingen die extra aandacht verdienen



Gevoelsstoornissen

Na inname van linezolid kunt u gevoelsstoornissen ondervinden zoals tintelingen in uw vingers of tenen. Hebt u zulke gevoelsstoornissen? Verwittig dan onmiddellijk uw arts.



Gezichtsstoornissen

Na inname van linezolid kunt u gezichtsstoornissen ervaren zoals wazig zicht. Mogelijk kunt u ook minder goed kleuren onderscheiden. Hebt u gezichtsstoornissen? Verwittig dan onmiddellijk uw arts, rij niet met een voertuig en gebruik geen gevaarlijke machines of apparaten. Bij langdurige inname van dit antibioticum moet u mogelijk regelmatig op controle bij de oogarts.



Maag- en darmklachten

De meest voorkomende bijwerkingen zijn misselijkheid, diarree of braken. Om de kans hierop te verlagen neemt u de tabletten het best in met voedsel. Verwittig uw arts bij ernstige diarree met bloed en/of slijm, terugkerende misselijkheid, braken of buikpijn.



Veranderingen in het bloed

Linezolid kan leiden tot veranderingen in het bloed, namelijk een daling in het aantal bloedcellen. Om deze bijwerking op te volgen doen we regelmatig bloedafnames.