

Vorbereiding

PET/CT-onderzoek bij patiënt met diabetes (hersenenindicaties)

DIENST NUCLEAIRE GENEESKUNDE

PET-CENTRUM

T +32 (0)9 332 30 28 | F +32 (0)9 332 38 07 | Ingang 20

DIENSTHOOFD

Prof. dr. G. Villeirs

STAFLEDEN

Dr. K. De Man | Prof. dr. I. Goethals | Prof. dr. V. Schelfhout |
Dr. B. Van den Broeck

We vragen u om vanaf drie dagen voor het onderzoek **onderstaand schema** te volgen en de glycemie te meten op het uur van het geplande onderzoek (zie bevestigingsmail). Als de glycemie **minder dan 120 mg/dl** is, kan u uw afspraak bevestigen. Als de glycemie meer dan 120 mg/dl bedraagt moet u de dienst Nucleaire geneeskunde contacteren voor verdere richtlijnen. Dit is belangrijk want anders kan het onderzoek mogelijk niet doorgaan op de geplande dag.

SPECIFIEK SCHEMA BIJ DIABETES/SUIKERZIEKTE

U moet vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter zijn (=geen vast voedsel eten, geen suikerhoudende dranken drinken, geen parenterale of enterale voeding, geen glucose-infuus).

Overleg op voorhand met uw behandelende arts of diabeteseducator als u twijfels hebt over dit schema.

Na het onderzoek mag u ontbijten en/of een normale maaltijd eten. U mag ook uw gebruikelijk behandelings-schema hervatten.

- U gebruikt tabletten of injecteerbare niet-insuline bevattende medicatie (Byetta®, Victoza®, Bydureon®, Lyxumia®, Metformine®):
 - Onderzoek gepland vóór 11 uur: geen ontbijt en geen medicatie innemen.
 - Onderzoek gepland na 11 uur: vier uur voor het onderzoek ontbijten en medicatie innemen
- U spuit insuline en het onderzoek is gepland vóór 11 uur:
 - 1 langwerkende spuit (Lantus®, Levemir®, Insulin Basal®, Insulatard®). Indien u 's avonds insuline spuit: gebruikelijke dosis toedienen. Indien u 's ochtends spuit: 80% van de gebruikelijke dosis toedienen (50% in geval van Insuman Ba al® of Insulatard®).
 - 2 of 3 spuiten menginsulines (Novomix®, Humuline® 30/70, Humalog Mix®): 's ochtends 50% van de gebruikelijke dosis toedienen.
 - 1 spuit langwerkende insuline + één of meer spuiten kortwerkende/maaltijdgebonden insuline:
 - Langwerkende insuline: zie hoger.
 - Kortwerkende/maaltijdgebonden insuline (Novorapid®, Apidra®, Humalog®, Actrapid®, Humuline®, Insuman Rapid®): niet toedienen en geen ontbijt.
 - Insulinepomp: gebruikelijke basale dosis aanhouden, geen bolus vermits geen ontbijt/maaltijd.
- U spuit insuline en het onderzoek is gepland na 11 uur: ontbijten en normale dosis insuline spuiten volgens schema. Vanaf 4 uur voor het onderzoek nuchter blijven: geen insuline spuiten en niet eten.

RESULTATEN NA TEST (AAN DE HAND VAN HET SPECIFIEKE SCHEMA)

Heeft u de bovenstaande richtlijnen begrepen? Ja / Nee

Heeft u de richtlijnen kunnen toepassen? Ja / Nee

Welke medicatie neemt u? _____

Wat heeft u de avond voor de test gegeten? _____

Glycemie: _____ mg/dl Datum: _____ Uur: _____