

Notes

Lined area for notes.

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirtio Print – 050015 – December 2019 – versie 01

Service Anesthésie

T +32 (0)9 332 32 81

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



POMPE ANTIDOULEUR



POMPE ANTIDOULEUR

Vous ferez bientôt l'objet d'une intervention à l'UZ Gent. Il est important que vous éprouviez un maximum de confort après l'opération. C'est la raison pour laquelle vous recevez une pompe antidouleur ou pompe PCA. PCA est l'acronyme de Patient Controlled Analgesia, c'est-à-dire que le patient a le contrôle de l'analgésie.

Cette brochure vous propose des informations sur l'utilisation de la pompe antidouleur.

Qu'est-ce qu'une pompe antidouleur ?

Une pompe antidouleur vous permet d'administrer vous-même votre antidouleur lorsque vous en avez besoin. Vous poussez vous-même sur un bouton de commande.

Avantages

Vous pouvez réguler mieux et plus rapidement l'analgésie car vous pouvez administrer l'antidouleur lorsque vous en avez besoin. Vous ne devez ni appeler le personnel infirmier ni attendre d'antidouleur sous une autre forme.

L'anesthésiste programme la pompe à l'avance afin que vous ne receviez jamais une dose trop élevée d'antidouleur.

Placement de la pompe antidouleur

Après votre intervention, nous vous gardons en observation dans l'unité de soins post-anesthésie (PAZA) ou dans le service des soins intensifs. Nous utilisons immédiatement la pompe antidouleur via une perfusion dans une veine de votre bras ou de votre cou, ou encore via un cathéter péridural dans votre dos. La pompe antidouleur contient la médication antidouleur préparée par l'anesthésiste ou l'infirmier de la douleur.

Nous fixons la pompe antidouleur à votre lit et plaçons la télécommande à portée de main.

Utiliser la pompe antidouleur

Lorsque la douleur est trop importante, vous appuyez sur le bouton de la pompe antidouleur. L'effet optimal de la médication antidouleur n'est ressenti qu'après 20 minutes. Ne laissez donc pas la douleur devenir trop violente. Si la douleur persiste alors que vous avez appuyé à plusieurs reprises sur le bouton, parlez-en à l'infirmier.

Une pompe antidouleur est-elle sans danger ?

L'anesthésiste détermine la quantité de médication qui vous est administrée à chaque pression. Nous adaptons ces réglages sur mesure à chaque patient. Vous ne devez pas redouter un surdosage. En cas de demande trop importante, la pompe ne délivre pas de médication. La pompe est sécurisée à l'aide d'un code et d'une clé. Personne ne peut donc simplement modifier les réglages.

Évaluation de la douleur

Après l'opération, l'équipe de la douleur vous rend visite quotidiennement afin d'évaluer le traitement antidouleur et de l'adapter éventuellement. À cet effet, vous indiquez un nombre compris entre zéro et dix. Zéro signifie une absence de douleur. Dix correspond à une douleur insupportable. L'évaluation de la douleur se fait au repos et en mouvement/pendant les soins.

Pendant combien de temps puis-je utiliser une pompe antidouleur ?

Vous pouvez utiliser la pompe antidouleur trois à cinq jours après l'opération. Naturellement, vous pouvez en parler avec l'équipe de la douleur. Lorsque la douleur a suffisamment diminué, nous retirons la pompe antidouleur et le cathéter. Nous passons alors éventuellement à une autre médication antidouleur par perfusion ou par voie orale.

Puis-je me déplacer avec une pompe antidouleur ?

Une pompe antidouleur limite votre liberté de mouvement. Tenez-en compte. Prenez également toujours soin du cathéter. Ne tirez pas sur la ligne de perfusion et bougez toujours calmement et prudemment.

En cas de pompe antidouleur péridurale, vous devez toujours demander l'aide du personnel infirmier si vous souhaitez sortir de votre lit.

Effets indésirables possibles

Malgré la sécurité et l'efficacité du système, plusieurs effets indésirables peuvent survenir : nausées, vomissements, besoin d'uriner, constipation, démangeaisons et somnolence. Ces effets indésirables sont de nature temporaire et disparaissent rapidement. Néanmoins, il est préférable de les signaler au médecin ou à l'infirmier.

Votre expérience avec une pompe antidouleur

Votre expérience avec une pompe antidouleur peut s'avérer utile pour nous aider à améliorer nos prestations de service. Faites part de toutes vos questions, remarques et problèmes à l'anesthésiste ou à l'infirmier de la douleur lors de leur visite.