

De ureterstent vervangen

Ondanks de krul boven- en onderaan kan de stent zich soms toch verplaatsen naar boven in de nier of naar onder in de blaas. Dat geeft niet noodzakelijk extra klachten, maar soms moet de stent daardoor opnieuw geplaatst worden of is die moeilijk te verwijderen. Dergelijke verplaatsing is echter zeldzaam.

Een stent die langere tijd ter plaatse zit, kan soms verkalen en verstopen. In dat geval kan het zijn dat de stent niet goed meer afloopt en dat die vervangen moet worden. In zeldzame gevallen zijn de verkalkingen zo uitgesproken dat een bijkomende behandeling nodig is om de stent te verwijderen.

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 060064 – Januari 2021 – versie 1

Poli Urologie

Ingang 71, route 710
T +32 (0)9 332 22 76

Verpleegafdeling Urologie

Ingang 50, route 615
T +32 (0)9 332 27 61

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



NAAR HUIS MET EEN URETERSTENT

JJ-STENT




NAAR HUIS MET EEN URETERSTENT (JJ-STENT)

U kreeg een ureterstent geplaatst. De stent is een fijn, hol buisje dat in de urineleider tussen de nier en de blaas zit en ter plaatse blijft dankzij twee krullen aan beide uiteindes: een in de nier en een in de blaas. Aan beide uiteinden zitten ook openingen om de urine af te voeren van de nieren naar de blaas.

Een ureterstent kan in één urineleider of in beide urineleiders geplaatst worden en verzekert de afloop van urine van de nier naar de blaas. Zo komt uw nier tot rust en hebt u minder kans op nierkolieken.

Wanneer u naar huis gaat, is het belangrijk dat u een afspraak hebt om uw ureterstent te verwijderen of te vervangen.



© 2011 Elsevier. All rights reserved.

Normale bijwerkingen

De aanwezigheid van de ureterstent veroorzaakt enkele normale bijwerkingen. Het is niet ongewoon of onrustwekkend als u een of meerdere van deze bijwerkingen ervaart:

- ▲ De krul van de ureterstent in de blaas kan blaasprikkeling veroorzaken. Daardoor kan je een **hevigere plasdrang** ervaren en het gevoel hebben dat je vaker moet plassen. Bij sommige patiënten is er ook beperkt urineverlies.
- ▲ Door terugstroom van urine naar de nier kunt u **flankpijn of druk in de nierstreek** ervaren bij een volle blaas of tijdens het plassen. Na het plassen vloeit de urine van de nier terug naar de blaas.
- ▲ Er kan wat **bloedverlies in uw urine** zichtbaar zijn omdat de stent in contact komt met de binnenkant van uw nier, urineleider en blaas. Hoe meer u beweegt, hoe meer bloed er in de urine zichtbaar kan zijn. Hoewel dat er soms angstwekkend uit ziet, is het niet ernstig zolang u blijft plassen.
- ▲ Bij beweging of inspanning kunt u de indruk hebben dat u **de stent voelt zitten**. Zolang dat niet storend is, vormt het geen probleem.

De bijwerkingen kunnen toenemen bij bepaalde activiteiten, maar verdwijnen zodra de stent wordt verwijderd. Bij pijnklachten kan een pijnstiller verlichting bieden. Als klasisieke pijnmedicatie onvoldoende is, kunnen de klachten vaak verholpen worden met specifieke medicatie.

Bespreek dit met uw arts.

Daarnaast raden wij u aan om dagelijks 1,5 à 2 liter water te drinken. Dat zorgt voor een natuurlijke spoeling van uw urinewegen, waardoor de kans op infectie verkleint en de hoeveelheid bloed in uw urine verdunt.

Alarmsignalen

Sommige patiënten ontwikkelen een urineweginfectie als gevolg van de stent of de ingreep. Een urineweginfectie is zeldzaam, maar moet wel behandeld worden.

Raadpleeg uw huisarts of het ziekenhuis bij:

- ▲ Koorts gelijk aan of hoger dan 38,5°C
- ▲ Toename van bloed of bloedklonters in uw urine
- ▲ Hevige pijn in de nierstreek

Het is soms moeilijk om de klachten van een urineweginfectie te onderscheiden van normale bijwerkingen. Daarom moet u zeker een urineonderzoek krijgen voordat u start met antibiotica.

Tijdens de kantooruren kunt u contact opnemen met uw huisarts of de dienst Urologie. Buiten de kantooruren, in het weekend of op feestdagen neemt u contact op met de Spoedgevallendienst.

Vermeld steeds dat u een ureterstent hebt.

De ureterstent verwijderen

U hebt een ureterstent meestal voor een korte periode. Als de stent niet langer nodig is, wordt die verwijderd op de polikliniek Urologie via een cystoscopie. Via de plasbuis brengt de uroloog een fijn flexibel buisje met camera tot in de blaas. Zo kan hij/zij de onderste krul van de stent in beeld brengen en met een fijn grijpinstrument vastgrijpen en verwijderen. Dat onderzoek is onaangenaam maar niet pijnlijk.

U hoeft hiervoor niet nuchter te zijn.