

Na het onderzoek

Als het onderzoek voorbij is, dan mag je kind nog even uitslapen in bed. Als hij/zij voldoende wakker is en iets kan eten, dan komt de arts nog even langs en mag je kind weer mee naar huis. Jullie krijgen een brief met uitleg over het onderzoek mee voor de huisarts.

Als je thuis bent en je kind heeft veel bloed bij de stoelgang, koorts of hevige buikpijn, contacteer dan je huisarts of het ziekenhuis.

Team

- ▲ Prof. dr. Saskia Vande Velde
- ▲ Prof. dr. Myriam Van Winckel
- ▲ Prof. dr. Stephanie Van Biervliet
- ▲ Prof. dr. Ruth De Bruyne

Afspraak

Je kind komt de dag voor het onderzoek naar het ziekenhuis.

Tot donderdag
om in het ziekenhuis.

Het onderzoek gebeurt op vrijdag
om

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 020029 – Januari 2021 – versie 1

Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen

Ingang 10, route 1030
T +32 (0)9 332 39 66

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



COLOSCOPIE ONDER NARCOSE

MET VOORBEREIDING
IN HET ZIEKENHUIS



COLOSCOPIE ONDER NARCOSE MET VOORBEREIDING IN HET ZIEKENHUIS

Beste ouders en jongere¹,

Je kind kreeg zonet een afspraak voor een coloscopie onder narcose. Dat is een onderzoek van de dikke darm waarbij de arts kan zien of er afwijkingen zijn in het slijmvlies van de dikke darm.

Het onderzoek

Bij een coloscopie wordt een soepele kijkbuis via de aars ingebracht in de dikke darm tot het laatste stukje van de dunne darm. Daarbij mag er op het moment van het onderzoek geen stoelgang meer in de dikke darm zijn die het zicht zou belemmeren. Stoelgang wordt tijdens de voorbereiding op het onderzoek verwijderd. Omdat het een onaangenaam onderzoek is, gebeurt dit terwijl je kind volledig in slaap is.

Als je kind jonger is dan 1 jaar, voorzie zelf een muts tegen onderkoeling.

Voorbereiding voor het onderzoek

Middagmaal

De voorbereiding voor het onderzoek begint de dag voordien (donderdagmiddag) met het middagmaal. Liefst geef je je kind die middag een lichte maaltijd (bv. wit brood met smeerkaas, yoghurt zonder vruchten, puree met appelmoes enz.) en eet hij/zij ook wat vroeger: ten laatste om 11 uur.

Spoelvloeistof

Je kind moet op korte tijd zeer grote hoeveelheden drinken van een vloeistof die niet lekker is. Daarom gebeurt die voorbereiding beter in het ziekenhuis. Je komt kort na het middageten naar de Specialistische pediatrie afdeling. Daar plaatsen we ten laatste om 14 uur een sonde langs de neus. Via de sonde doen we de vloeistof inlopen die de darmen van je kind schoonmaken.

Heldere vloeistoffen

Tijdens de voorbereiding mag je kind niet meer eten maar enkel heldere vloeistoffen drinken: water, appelsap, heldere sportdranken, heldere vruchtensappen zonder pulp, kruiden-thee, heldere vruchtenthee, wit druivensap, heldere bouillon enz. Je mag de vloeistoffen ook van thuis meebrengen. Die regel volgen is heel **belangrijk voor het succes van de darmvoorbereiding**. Ook als je kind honger heeft, mag hij/zij enkel heldere vloeistoffen drinken. Als het onderzoek immers doorgaat in een darm die niet volledig schoon is, moet het onderzoek misschien opnieuw gebeuren.

De vloeistof zal zo snel mogelijk inlopen omdat de darmen dan vlugger schoon zijn. Als gevolg daarvan krijg je diarree, dat is de bedoeling. Uiteindelijk moet de stoelgang er bijna als helder water uitzien.

Voorbereiding voor de narcose

Voor een onderzoek onder verdoving is het nodig dat je kind **nuchter** is. Hij/zij zal dus niet meer gegeten of gedronken hebben vanaf 8 uur voor het onderzoek. Soms moet hij/zij wel zijn/haar **medicijnen** nemen, maar dat beslist de arts.

Vanop de verdieping wordt je kind gebracht naar de plaats waar het onderzoek door zal gaan, natuurlijk mag er een ouder mee.

De verdoving of narcose

Op de plaats van het onderzoek vraagt de arts die je kind in slaap zal brengen (de anesthesist) of je kind iets gegeten of gedronken heeft. Als het antwoord ja is, kan het onderzoek helaas niet doorgaan.

Verder vraagt de anesthesist ook of je kind liever met het masker dan wel met een prikje in slaap gaat. Je kind mag dat zelf kiezen. Een prikje is vervelend omdat het wat pijn doet, het masker met slaapgase geeft dan weer een slechte geur af.

We brengen je kind niet onder narcose als hij/zij ziek is, bv. koorts, verkouden enz., tenzij het echt dringend is. Verwittig ons in dat geval, zodat we het onderzoek kunnen uitstellen:

- ▲ tijdens de werkuren:
het secretariaat (tel. 09 332 39 66)
of de verpleegafdeling (tel. 09 332 35 40)
- ▲ buiten de werkuren:
de assistent van wacht (tel. 09 332 35 15)

De coloscopie

Omdat je kind volledig in slaap is tijdens de coloscopie, herinnert hij/zij zich niets van het onderzoek. De arts kijkt langs de aars met een soepele buisvormige camera in de darm. Zo kunnen we van heel dichtbij de darmwand onderzoeken, op voorwaarde dat er geen stoelgang in de darm meer zit.

Tijdens het onderzoek kan de arts kleine stukjes weefsel wegnemen om indien nodig onder de microscoop te onderzoeken. Als de arts een poliep vindt, wordt ook die weggenomen. Daardoor kan er bij de volgende stoelgang wat bloed aanwezig zijn. Dat is normaal.

¹ Deze brochure is ook voor jongeren. Voor de leesbaarheid is de tekst aan de ouders gericht.