

Na het onderzoek

Als het onderzoek voorbij is, dan mag je kind nog even uitslapen in bed. Als hij/zij voldoende wakker is en iets kan eten, dan komt de arts nog even langs en mag kind je weer mee naar huis. Jullie krijgen een brief met uitleg over het onderzoek voor de huisarts.

Twijfels of vragen?

Als je twijfels of vragen hebt, bel dan gerust. Als de assistent ze niet kan beantwoorden, wordt er iemand van de dienst Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen gecontacteerd.

Team

- ▲ Prof. dr. Saskia Vande Velde
- ▲ Prof. dr. Myriam Van Winckel
- ▲ Prof. dr. Stephanie Van Biervliet
- ▲ Prof. dr. Ruth De Bruyne

Afspraak

Tot vrijdag.....

om.....

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 020053 – Januari 2021 – versie 1

Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen

Ingang 10, route 1030
T +32 (0)9 332 39 66

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



GASTROSCOPIE ONDER NARCOSE



GASTROSCOPIE ONDER NARCOSE

Beste ouders en jongere¹,

Je kind kreeg zonet een afspraak voor een gastroscopie onder narcose. Dat is een onderzoek van de slokdarm, maag en dunne darm. Zo kan de dokter zien of er afwijkingen zijn in het slijmvlies van de slokdarm, maag en dunne darm.

Het onderzoek

Bij een gastroscopie wordt een soepele kijkbuis via de mond ingebracht tot in de dunne darm. De diameter en grootte van de kijkbuis is aangepast aan de leeftijd van je kind. Omdat het een onaangenaam onderzoek is, gebeurt dat terwijl je kind volledig in slaap is.

Als je kind jonger is dan 1 jaar, voorzie zelf een muts tegen onderkoeling.

Vorbereiding

Meestal is er niet veel voorbereiding aan een gastroscopie. Het belangrijkste is dat je kind **volledig nuchter** naar het ziekenhuis komt en dus niets gegeten of gedronken heeft tot 8 uur voor het onderzoek. Dat is belangrijk voor de veiligheid van je kind. Soms moet je kind wel zijn/haar **medicijnen** nemen, maar dat beslist de arts.

Aankomst in het ziekenhuis

Jullie worden verwacht op het dagziekenhuis van het Kinderziekenhuis. Van daaruit worden jullie begeleid naar de plaats waar het onderzoek zal doorgaan. Natuurlijk mag er een ouder meegaan.

Verdoving of narcose

Op de plaats van het onderzoek vraagt de arts die je kind in slaap zal brengen (de anesthesist) of je kind iets gegeten of gedronken heeft. Als het antwoord ja is, kan het onderzoek helaas niet doorgaan.

Verder vraagt de anesthesist ook of je kind liever met het masker dan wel met een prikje in slaap gaat. Je kind mag dat zelf kiezen. Een prikje is vervelend omdat het wat pijn doet, het masker met slaapgaz geeft dan weer een slechte geur af.

We brengen je kind **niet onder narcose als hij/zij ziek is**, bv. koorts, verkouden enz., tenzij het echt dringend is. Verwittig ons in dat geval, zodat we het onderzoek kunnen uitstellen:

- ▲ tijdens de werkuren:
het secretariaat (tel. 09 332 39 66)
of het dagziekenhuis (tel. 09 332 37 72)
- ▲ buiten de werkuren:
de assistent van wacht (tel. 09 332 35 15)

De gastroscopie

Omdat je kind volledig in slaap is terwijl de gastroscopie gebeurt, herinnert hij/zij zich niets van het onderzoek. De dokter kijkt met een soepele, buisvormige camera langs de mond in de slokdarm, maag en dunne darm. De grootte van het instrument is aangepast aan de leeftijd van je kind. Dankzij het onderzoek kunnen de artsen meteen letsels zien die de klachten kunnen verklaren. Het resultaat van de gastroscopie krijgen jullie onmiddellijk na het onderzoek.



Mogelijke bijkomende behandelingen

- ▲ Als de afwijkingen niet zichtbaar zijn met de vergroting die we door het onderzoek krijgen, moeten we **weefselstukjes** (bipten) nemen met een heel kleine tang. Die worden dan onderzocht met een microscoop. Voor de resultaten van bipten heeft het labo minstens 1 week nodig. We spreken af hoe je op de hoogte gesteld wordt van die resultaten.
- ▲ Soms plaatsen we tijdens de narcose al de sonde voor de **pH-metrie**. Het toestel kan de dag erna worden afgelezen. Jullie krijgen het resultaat van de arts of soms nadien, samen met de resultaten van de biopsie. Hou je kind in het begin goed in de gaten bij het ontwaken. Hij/zij kan onrustig worden en de sonde per ongeluk verwijderen.
- ▲ Als er een **vernaauwing van de slokdarm** aanwezig is, dan kunnen we dit verhelpen tijdens hetzelfde onderzoek. De klachten van je kind zullen onmiddellijk verbeteren. Er bestaat een klein risico dat de slokdarmwand scheurt. Als deze verwikkeling zich voordoet, moet je kind overnachten en eventueel antibiotica via een baxter krijgen.
- ▲ Als er een **vreemd voorwerp** in de slokdarm of de maag aanwezig is, wordt het verwijderd met speciaal daarvoor ontworpen tangetje of lus.
- ▲ Als er **spataders** zijn op de slokdarm kan het nodig zijn om ze af te binden met elastiekjes of in te spuiten met een vloeistof om te voorkomen dat de spataders bloeden. Na zo'n procedure is het belangrijk dat je kind wat langer onder bewaking blijft, zeker tot de dag nadien.

¹ Deze brochure is ook voor jongeren. Voor de leesbaarheid is de tekst aan de ouders gericht.