

Twijfels of vragen?

Veel succes met de voorbereiding. Dit is het lastigste deel van het onderzoek. Als je twijfels of vragen hebt, bel dan gerust. Als de assistent ze niet kan beantwoorden, wordt er iemand van de dienst Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen gecontacteerd.

Team

- ▲ Prof. dr. Saskia Vande Velde
- ▲ Prof. dr. Myriam Van Winckel
- ▲ Prof. dr. Stephanie Van Biervliet
- ▲ Prof. dr. Ruth De Bruyne

Afspraak

Tot vrijdag.....

om.....

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirtio Print – 020052 – Januari 2021 – versie 1

Maag-, darm-, leverziekten en voedingsproblemen kinderen

Ingang 10, route 1030
T +32 (0)9 332 39 66

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



LINKERCOLOSCOPIE ONDER NARCOSE

MET VOORBEREIDING
MET FLEET®-LAVEMENT



LINKERCOLOSCOPIE ONDER NARCOSE MET VOORBEREIDING MET FLEET®-LAVEMENT

Beste ouders en jongere¹,

Je kind kreeg zonet een afspraak voor een coloscopie onder narcose. Dat is een onderzoek van de dikke darm waarbij de arts kan zien of er afwijkingen zijn in het slijmvlies van de dikke darm.

Het onderzoek

Bij een linkercoloscopie wordt een soepele kijkbuis via de aars ingebracht in de dikke darm tot waar de stoelgang zich bevindt. Daarbij mag er op het moment van het onderzoek geen stoelgang meer in het onderste stuk van de dikke darm zijn die het zicht zou belemmeren. Stoelgang wordt tijdens de voorbereiding op het onderzoek verwijderd. Omdat het een onaangenaam onderzoek is, gebeurt dit terwijl je kind volledig in slaap is.

Als je kind jonger is dan 1 jaar, voorzie zelf een muts tegen onderkoeling.

Voorbereiding voor het onderzoek

Fleet®-lavement

We moeten enkel de onderste centimeters van de darm zien voor het onderzoek. Daarom krijgt je kind een Fleet®-lavement om stoelgang te verwijderen:

- ▲ de avond voor het onderzoek
- ▲ de ochtend van het onderzoek: ongeveer 1 uur voor je thuis vertrekt

Een Fleet®-lavement is een medicijn in een flacon. De canule breng je via de aars in het onderste stukje van de darm. Duw daarna de flacon leeg in de darm. Je kind krijgt daardoor de drang om stoelgang te maken en wellicht krampen als bijwerking. Het lavement ophouden is moeilijk, dus zorg dat je kind in de buurt van een toilet is.



Narcose

Voor een onderzoek onder verdoving is het nodig dat je kind **nuchter** naar het ziekenhuis komt. Soms moet hij/zij wel zijn/haar **medicijnen** nemen, maar dat beslist de arts.

Aankomst in het ziekenhuis

Jullie worden verwacht op het dagziekenhuis van het Kinderziekenhuis. Van daaruit worden jullie begeleid naar de plaats waar het onderzoek zal doorgaan. Natuurlijk mag er een ouder meegaan.

Verdoving of narcose

Op de plaats van het onderzoek vraagt de arts die je kind in slaap zal brengen (de anesthesist) of je kind iets gegeten of gedronken heeft. Als het antwoord ja is, kan het onderzoek helaas niet doorgaan.

Verder vraagt de anesthesist ook of je kind liever met het masker dan wel met een prikje in slaap gaat. Je kind mag dat zelf kiezen. Een prikje is vervelend omdat het wat pijn doet, het masker met slaapgas geeft dan weer een slechte geur af.

We brengen je kind niet onder narcose als hij/zij ziek is, bv. koorts, verkouden enz., tenzij het echt dringend is. Verwittig ons in dat geval, zodat we het onderzoek kunnen uitstellen:

- ▲ tijdens de werkuren:
het secretariaat (tel. 09 332 39 66)
of het dagziekenhuis (tel. 09 332 37 72)
- ▲ buiten de werkuren:
de assistent van wacht (tel. 09 332 35 15)

De linkercoloscopie

Omdat je kind volledig in slaap is tijdens de linkercoloscopie, herinnert hij/zij zich niets van het onderzoek. De arts kijkt langs de aars met een soepele buisvormige camera in de darm. Zo kunnen we van heel dichtbij de darmwand onderzoeken, op voorwaarde dat er geen stoelgang in de darm meer zit.

Tijdens het onderzoek kan de arts kleine stukjes weefsel wegnemen om indien nodig onder de microscoop te onderzoeken. Als de arts een poliep vindt, wordt ook die weggenomen. Daardoor kan er bij de volgende stoelgang wat bloed aanwezig zijn. Dat is normaal.

Na het onderzoek

Als het onderzoek voorbij is, dan mag je kind nog even uitslapen in bed. Als hij/zij voldoende wakker is en iets kan eten, dan komt de arts nog even langs en mag je kind weer mee naar huis. Jullie krijgen een brief met uitleg over het onderzoek mee voor de huisarts.

Als je thuis bent en je kind heeft veel bloed bij de stoelgang, koorts of hevige buikpijn, contacteer dan je huisarts of het ziekenhuis.

¹ Deze brochure is ook voor jongeren. Voor de leesbaarheid is de tekst aan de ouders gericht.