

JOUW BEHANDELING MET DASATINIB

INHOUD

01	Inleiding	3
02	Hoe werkt dasatinib?	3
03	Inname van dasatinib	4
04	Pletten / breken	5
05	Bewaring	5
06	Bijwerkingen	6
07	Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid	14
08	Geneesmiddelen en andere producten die je niet mag combineren met dasatinib	15
09	Vaccinaties tijdens je behandeling met dasatinib	17
10	Waar verkrijgbaar?	18

01 INLEIDING

In deze infobrochure vind je bijkomende informatie over je behandeling. Verder krijg je handige tips om bijwerkingen te vermijden of te behandelen. We geven ook aan wanneer je het best de arts, de verpleegkundig consultant of de apotheker verwittigt. Zij geven je graag meer uitleg, dus contacteer hen gerust.

02 HOE WERKT DASATINIB?

Dasatinib gebruiken we om chronische myeloïde leukemie (CML) of een bepaalde vorm van acute lymfatische leukemie (Ph+ ALL) te behandelen. Het werkt doelgericht tegen een fout in abnormale witte bloedcellen, waardoor die in aantal verminderen en de goede bloedcellen opnieuw kunnen groeien.

Dasatinib is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam:

Als dat mogelijk is wordt deze medicatie **NIET** ingewisseld voor andere merken met hetzelfde werkzame bestanddeel.

In principe duurt de behandeling van CML of Ph+ ALL levenslang, maar hoe lang je dasatinib moet innemen hangt af van hoe je de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling.

03 INNAME VAN DASATINIB

Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- ▲ Dosis + startdatum: _____
- ▲ De dosis is afhankelijk van je ziekte en hoe je de behandeling verdraagt. Neem één keer **per dag één tablet van 20 mg, 50 mg, 70 mg of 100 mg** of een combinatie: _____
- ▲ Neem dasatinib elke dag op hetzelfde tijdstip (mag **met of zonder voedsel**).
- ▲ Slik de tablet(ten) in hun geheel door, zonder pletten of kauwen, met een glas water.

Soms gebeurt het dat de bijwerkingen te ernstig zijn of het effect niet optimaal is. In dat geval kan de arts je dosis verlagen, verhogen of de behandeling tijdelijk stoppen om je lichaam de kans te geven om te herstellen. Contacteer zeker je arts, de oncologisch verpleegkundige of de ziekenhuisapotheker van zodra je bijwerkingen ervaart.



Wijzig de dosering of stop de behandeling nooit op eigen houtje! Neem altijd de dosering die je arts heeft voorgeschreven.

Belang van een juiste inname van je medicatie

Je moet dasatinib dagelijks innemen. Zo werkt het geneesmiddel constant tegen de abnormale witte bloedcellen met een optimale doeltreffendheid en slaagkans tot gevolg. Als je dasatinib slechts af en toe zou innemen, krijgen de abnormale witte bloedcellen meer kans om opnieuw te groeien.

Er kan een moment komen waarop je zou willen stoppen met de behandeling, zeker als bijwerkingen de kop opsteken. Hou vol. Als je bijwerkingen ervaart, bespreek dat dan zeker met je arts, de oncologisch verpleegkundige of de ziekenhuisapotheker, zodat jullie samen tot een oplossing kunnen komen.

Wat als je een inname bent vergeten of na braken?

Ben je vergeten het middel in te nemen?

- ▲ Neem je dosis zo snel mogelijk op dezelfde dag. Neem je volgende dosis de volgende dag in op het gebruikelijke tijdstip.
- ▲ Neem nooit een dubbele dosis in op dezelfde dag om een vergeten dosis in te halen.

Meld een niet-ingenomen dosis altijd bij je volgende ziekenhuisbezoek.

Als je braakt nadat je dasatinib hebt ingenomen, neem dan geen extra dosis. Neem je volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip.

Wat als je te veel tabletten hebt ingenomen?

Als je per vergissing te veel dasatinib hebt ingenomen of iemand anders heeft je tabletten ingeslikt, neem dan altijd contact op met je arts, de spoedafdeling van het ziekenhuis of het antigifcentrum (tel. 070 245 245) voor advies.

04 PLETTEN / BREKEN

Je mag de tabletten **NIET** pletten, **NIET** breken en **NIET** oplossen.

Contacteer bij slikproblemen je arts of ziekenhuisapotheker om andere toedieningsmogelijkheden te bespreken.

05 BEWARING

- ▲ Bewaar dasatinib op kamertemperatuur op een veilige plaats in de originele verpakking.
- ▲ Bewaar de medicatie buiten het bereik van kinderen.
- ▲ Gebruik de medicatie niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum die terug te vinden is op de verpakking naast 'EXP'.



Als je geen dasatinib meer moet gebruiken of het geneesmiddel is vervallen, breng dan de overige tabletten naar je arts of apotheker. Gooi ze niet in de vuilnisbak.

06 BIJWERKINGEN

Het is mogelijk dat er tijdens de behandeling bijwerkingen optreden. De intensiteit en aard van die bijwerkingen verschillen van persoon tot persoon. Sommigen hebben heel veel ongemakken, anderen geen enkele.

Breng zeker je arts, verpleegkundige of apotheker op de hoogte als je bijwerkingen ervaart. Ze geven je graag advies om de klachten te verminderen of te behandelen.

Maak je niet ongerust als je weinig bijwerkingen ervaart. Dat betekent zeker niet dat de therapie onvoldoende of niet werkt.

Volgende bijwerkingen kan je ervaren:

▲ Vermoeidheid	6
▲ Misselijkheid en braken	8
▲ Diarree	9
▲ Veranderingen aan de huid	10
▲ Vermindering van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes	11
▲ Spierpijn	13
▲ Hoofdpijn	13
▲ Vochtophoping (oedemen)	14

Vermoeidheid

Dit is een heel vaak voorkomende bijwerking. Vermoeidheid kenmerkt zich door:

- ▲ je algemeen zwak voelen
- ▲ zware ledematen
- ▲ verminderde aandacht en concentratie
- ▲ niet goed slapen, een toegenomen slaapbehoefte
- ▲ geïrriteerd zijn
- ▲ belemmering bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten
- ▲ zware vermoeidheid na een inspanning
- ▲ je niet goed in je vel voelen

De vermoeidheid kan een sterke impact hebben op je dagelijkse activiteiten. Deze tips helpen je om de mogelijke ongemakken te beperken.



TIPS

- ▲ Probeer je normale levenspatroon zoveel mogelijk te behouden.
- ▲ Plan je activiteiten en voer ze op je eigen tempo uit. Geef voorrang aan de activiteiten die werkelijk nodig zijn die dag en die je graag doet.
- ▲ Las korte rustpauzes in.
- ▲ Rust regelmatig een half uurtje i.p.v. echt te slapen overdag.
- ▲ Vraag hulp aan vrienden en familie of schakel professionele thuiszorg in (dat kan via de Sociale dienst).
- ▲ Zorg voor een evenwichtige voeding en drink voldoende.
- ▲ Maak korte wandelingen en doe lichte activiteiten, dat kan deugd doen.
- ▲ Maak voldoende tijd vrij voor ontspanning.
- ▲ Zorg voor een goede nachtrust, ga op vaste tijden naar bed en sta op vaste tijden op.
- ▲ Als je de slaap niet kan vatten, blijf dan niet in bed liggen. Sta op en ga iets drinken of doe kort iets ontspannends.
- ▲ Praat met je arts en verpleegkundige als je slaapproblemen blijft hebben. Zij kunnen je helpen.

LET OP

- ▲ Als je je ongewoon moe voelt, wees dan voorzichtig als je autorijdt of machines bedient.
- ▲ Vermijd onnodige activiteiten, stress of spanningssituaties.
- ▲ Drink niet te veel alcohol.
- ▲ Slaap niet te veel overdag zodat je voldoende moe bent tegen bedtijd.
- ▲ Vermijd stimulerende middelen (zoals cafeïnerijke dranken) voor het slapengaan.



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

In bepaalde gevallen van ernstige vermoeidheid, bv. als je kortademig bent bij een lichte inspanning of in rust.

Het UZ Gent organiseert een vijftal keer per jaar vermoeidheidssessies voor patiënten en familieleden. De verpleegkundig consulent en psychologen kunnen je dan weer individueel begeleiden.

Je kan ook mindfulness volgen. Deze therapie heeft haar nut bewezen bij de aanpak van vermoeidheid. Meer info: Ingrid Jacobs, psycholoog (ingrid.jacobs@uzgent.be, tel. 09 332 54 08). Of kijk op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Ondersteuning, welzijn en revalidatie'.

Misselijkheid en braken

Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking. De intensiteit verschilt van persoon tot persoon. Misselijkheid kan leiden tot braakneigingen en braken.

Bij de meeste personen gaat het om een zwakke tot matige vorm van deze bijwerking. Je kan last hebben van:

- ▲ minder eetlust
- ▲ een zwaar gevoel in de maag
- ▲ een opgeblazen gevoel
- ▲ een pijnlijke maag
- ▲ braakneigingen

De misselijkheid treedt meestal op tijdens een korte periode en dan vooral in de beginfase van de behandeling. De richtlijnen hieronder kunnen je helpen het ongemak te beperken.



TIPS

- ▲ Eet kleine hoeveelheden, gespreid over de dag. Vermijd zware maaltijden.
- ▲ Eet wat je lekker vindt.
- ▲ Eet droge voeding zoals granen en toast.
- ▲ Drink regelmatig water, maar wel in kleine hoeveelheden zodat je geen opgeblazen gevoel hebt.
- ▲ Zorg voor voldoende frisse lucht.
- ▲ Als je moest braken, spoel dan je mond met koud water en wacht één tot twee uur voor je weer iets eet.
- ▲ Als je misselijk bent, geef dan de voorkeur aan koude of lauwe gerechten. Die geven minder geur af dan warm eten.
- ▲ Vraag je (huis)arts een middel tegen misselijkheid of braken, bij voorkeur metoclopramide (Primperan®). Domperidone (Motilium®) is minder aangewezen door de wisselwerking met dasatinib. Neem het anti-braakmiddel in 30 minuten voor de maaltijd of zoals voorgeschreven door je arts. Als je na de inname van de medicatie misselijk wordt, neem je het middel het best 30 minuten voor de medicatie.

LET OP

- ▲ Vermijd sterke kruiden, te zoet, gebraden of vet voedsel (bv. gefrituurd voedsel).
- ▲ Drink zo weinig mogelijk tijdens de maaltijd, want dat neemt je eetlust weg.
- ▲ Ga niet onmiddellijk liggen na de maaltijd. Een halfzittende houding is beter.
- ▲ Als je misselijk bent, vermijd dan sterke geuren. Die kunnen de misselijkheid verergeren.
- ▲ Drink niet te veel alcohol.



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

Als de misselijkheid of het braken leidt tot:

- ▲ onvoldoende voedselopname met ernstig gewichtsverlies tot gevolg (meer dan 10 % van het lichaamsgewicht)
- ▲ uitdroging (dorst, droge huid, droge lippen, weinig plassen)
- ▲ een pijnlijke of gezwollen maag
- ▲ heel frequent braken (meer dan driemaal per dag)

Diarree

De behandeling met dasatinib kan leiden tot diarree. Dat betekent dat je vaker stoelgang maakt en dat je stoelgang waterig kan zijn. Deze bijwerking is doorgaans licht tot matig ernstig.



TIPS

- ▲ Drink regelmatig water, zodat je genoeg vocht opneemt (1,5 l per dag).
- ▲ Bij grote vochtverliezen moet je vaker drinken (2 tot 2,5 l per dag). Drink dan bijvoorbeeld sportdranken, zodat je ook de nodige mineralen binnenkrijgt (Aquarius®, AA Drink®).
- ▲ Kijk regelmatig na of je urine niet te donker is. Dat kan een teken zijn van uitdroging.
- ▲ Eet vet- en vezelarme voeding zoals:
 - pasta, wit brood of rijst
 - mager vlees (kalkoen, kip)
 - cornflakes
 - vis
 - geschild fruit
- ▲ Eet tijdelijk geen vezelrijke voeding meer.
- ▲ Het slijmvlies van de sluitspier kan geïrriteerd zijn door de diarree. Gebruik zacht toiletpapier of een washandje. Zorg voor een goede lichaamshygiëne en breng een zinkzalf aan rond de sluitspier om de huid te beschermen.
- ▲ Vraag aan je (huis)arts een middel tegen diarree. Loperamide (Imodium®) mag je gebruiken.

LET OP

- ▲ Vermijd voedingsmiddelen die de darmbeweging doen toenemen:
 - grote en vetrijke maaltijden
 - alcohol (bier, wijn)
 - cafeïnehoudende dranken (koffie, thee, chocolade)
 - voeding met grove vezels, zaden of pitten (volkorenbrood)
 - schillen van fruit, noten
- ▲ Vermijd voedingsmiddelen die de gasvorming verhogen:
 - ui, prei, kool, knoflook, paprika, komkommer, meloen
 - koolzuurhoudende dranken
- ▲ Vermijd voedingsmiddelen die de darmslijmvliesen irriteren (sterke kruiden en specerijen).
- ▲ Vermijd producten die sorbitol bevatten (snoepgoed en kauwgom).
- ▲ Vermijd melk en zuivelproducten (melk, yoghurt, ijs, kaas, room).



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

- ▲ Als de diarree gepaard gaat met koorts, ernstige krampen of braakneigingen.
- ▲ Als je last hebt van uitdrogingsverschijnselen: een droge mond, een droge tong, droge lippen, een droge en verrimpelde huid en donkere urine.
- ▲ Als je last hebt van een bloederige stoelgang.

Veranderingen aan de huid

De behandeling met dasatinib kan bijwerkingen veroorzaken aan de huid en/of nagels. Die veranderingen kunnen zijn:

- ▲ een rode huid
- ▲ huiduitslag
- ▲ jeuk
- ▲ schilfering van de huid
- ▲ haarverlies



TIPS

- ▲ Gebruik regelmatig een verzachtende en vochtinbrengende crème, vooral op droge zones. Gebruik een neutrale crème, die niet geperfumeerd is.
- ▲ Neem liever een douche in plaats van een bad. In bad liggen kan de huid te veel verweken.
- ▲ Gebruik bij het douchen het best een neutrale en ongeparfumeerde douchegel.
- ▲ Gebruik een hoge beschermingsfactor (bv. factor 50) bij blootstelling aan de zon.
- ▲ Draag het best loszittende, katoenen kledij. Zorg voor een goede verluchting van de huid.
- ▲ Als je last hebt van jeuk, vraag dan een jeukstillend geneesmiddel aan je arts of apotheker.

LET OP

- ▲ Vermijd directe blootstelling aan de zon.
 - ▲ Vermijd te warme of te veelvuldige douches.
-



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?
Als de huiduitslag en/of de jeuk hinderlijk wordt.

Vermindering van het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes

Door je behandeling kan het aantal bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen verminderen.

Rode bloedcellen

Rode bloedcellen zijn in ons lichaam belangrijk om zuurstof te vervoeren. Bij een verminderd aantal rode bloedcellen kan bloedarmoede optreden. Hierdoor kan je volgende symptomen hebben:

- ▲ vermoeid zijn
- ▲ verminderde inspanningscapaciteit
- ▲ algemeen gevoel van zwakte
- ▲ bleke huid en lippen
- ▲ duizeligheid
- ▲ kortademigheid bij inspanning



TIPS

- ▲ Plan je activiteiten gespreid over de dag. Wissel ze tijdig af met een korte rustpauze.
- ▲ Vraag aan anderen om ook een handje te helpen.
- ▲ Zorg voor een goede voeding met voldoende ijzer (runds- en lamsvlees, donkergroene bladgroenten, broccoli, bonen) en vitamine B (melk, eieren, kaas, vlees), vitamine C (paprika, kiwi) en foliumzuur (spinazie, broccoli, bonen, volkorenbrood).
- ▲ Drink voldoende.



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

- ▲ Als je je duizelig voelt of kortademig bent.
- ▲ Als je je bij de minste inspanning heel moe voelt.

Witte bloedcellen

Bij een verminderd aantal witte bloedcellen verhoogt de kans op infectie. Witte bloedcellen zijn namelijk de soldaten van ons lichaam die vechten tegen indringers. Zonder witte bloedcellen kan je je niet verdedigen. Als je zonder witte bloedcellen een infectie oploopt, kan je heel snel heel ernstig ziek worden.

Een te laag aantal witte bloedcellen treedt meestal in het begin van de behandeling op, waarna de waarden gewoonlijk opnieuw normaliseren. **Vooraf in het begin van je behandeling** moet je hierop letten en bij koorts of infectie **contact opnemen met het ziekenhuis**. Als je langer dasatinib neemt zonder problemen, neem je bij koorts of infectie het best eerst contact op met je huisarts die je zal doorverwijzen als dat nodig is.

Tekenen van een infectie kunnen zijn:

- ▲ koorts, zweten, koude rillingen
- ▲ keelpijn, hoest, verstopte neus
- ▲ een branderig gevoel bij het plassen
- ▲ ziektegevoel en uitputting
- ▲ roodheid, zwelling, ettervorming (lokale infectie)



TIPS

- ▲ Meet regelmatig je lichaamstemperatuur, bij voorkeur altijd op hetzelfde tijdstip (bv. 's avonds). Verwittig bij 38°C of meer altijd je huisarts of het ziekenhuis!
- ▲ Zorg voor een goede lichaamshygiëne. Was regelmatig je handen.
- ▲ Pas een goede mondzorg toe en controleer je mond op roodheid of aften.
- ▲ Voorkom wondjes en draag bijvoorbeeld handschoenen als je klusjes doet. Heb je toch een wondje, ontsmet het onmiddellijk en volg het dagelijks op.
- ▲ Vermijd contact met mensen die griep hebben of verkouden zijn.
- ▲ Vermijd drukbevolkte plaatsen, zoals winkels, bioscoop, zwembaden, sportmanifestaties, markt ...
- ▲ Laat anderen tijdelijk je huisdieren verzorgen.



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

Als je tekenen van een infectie opmerkt of koorts hebt.

Neem vanaf 38°C **ALTIJD** contact op met je behandelende arts, de verpleegkundig consulent of de verpleegkundige van het dagziekenhuis/de verpleegafdeling. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen in als je vermoedt dat je een infectie hebt.

Bloedplaatjes

Bloedplaatjes spelen een rol bij de bloedstolling. Bij een ernstig tekort aan bloedplaatjes is er een toegenomen risico op bloedingen. Het aantal bloedplaatjes kan verminderen door je behandeling. Hierdoor vergroot de kans op blauwe plekken, onderhuidse bloedingen, neusbloedingen, bloedend tandvlees ...



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

- ▲ Bij herhaaldelijke neusbloedingen die niet onmiddellijk te stelpen zijn.
- ▲ Bij bloedingen in de mond, urine, stoelgang ...

Spierpijn

Dit is een vervelende maar ongevaarlijke bijwerking. Ze kenmerkt zich door:

- ▲ spierkrampen
- ▲ spierspasmen



TIPS

- ▲ Sommige mensen vinden dat warmte een positief effect heeft op hun spierpijn. Een warmwaterkruik, kersenpitkussen, infraroodstralen ... kunnen dan helpen.
- ▲ Een afkoelende crème kan je spierpijn eventjes doen vergeten.
- ▲ Massage verhoogt de doorbloeding in de spier waardoor de pijn vermindert.
- ▲ Bij veel last en na overleg met je arts kan je eventueel pijnstillers nemen.

Hoofdpijn

Hoofdpijn is een heel frequente bijwerking, maar duurt gewoonlijk niet lang. De pijn gaat meestal over zonder enige interventie. De volgende tips kunnen je hoofdpijn verzachten:



TIPS

- ▲ Neem regelmatig eens een frisse neus.
- ▲ Zorg voor een goede nachtrust.
- ▲ Neem voldoende ontspanning.
- ▲ Als de hoofdpijn te hinderlijk wordt, kan je een pijnstiller zoals paracetamol nemen. Brengt dat geen beterschap, contacteer dan je arts.

LET OP

- ▲ Neem niet te vaak en te lang na elkaar pijnstillers. Als je te veel pijnstillers gebruikt, kan dat juist voor hoofdpijn zorgen.



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?

- ▲ Als je hevige hoofdpijn krijgt, met koorts, een pijnlijke of stijve nek, sufheid of overgeven.
- ▲ Als je plots uitvalsverschijnselen krijgt, zoals een verlamde arm, een scheve mond, onduidelijk praten of minder zien.

Vochtophoping (oedemen)

De behandeling met dasatinib kan gepaard gaan met gewichtstoename. Dat komt omdat dasatinib ervoor kan zorgen dat je lichaam meer vocht vasthoudt (bv. rond de ogen of in de benen).



TIPS

- ▲ Controleer regelmatig je gewicht.
 - ▲ Gebruik niet te veel zout.
 - ▲ Neem voldoende beweging.
 - ▲ Als dat nodig is schrijft je arts plaspillen voor om het extra vocht af te drijven.
-

Dasatinib kan ook vochtophoping rond de longen (pleuravocht) veroorzaken. Dat kan in het begin van de behandeling optreden of pas na langere tijd onder de medicatie.



Wanneer neem je contact op met het ziekenhuis?
Als je last krijgt van kortademigheid of een benauwd gevoel.

07 ZWANGERSCHAP, BORSTVOEDING EN VRUCHTBAARHEID

Vruchtbare mannen met een partner die zwanger kan worden en vrouwen die zwanger kunnen worden, moeten een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot drie maanden na het stoppen van de behandeling met dasatinib. Vrouwen mogen **NIET** zwanger worden tijdens de behandeling met dasatinib omdat het geneesmiddel een schadelijk effect kan hebben op de baby. Bespreek met je arts wat de beste anticonceptiemethoden voor jou en je partner zijn.

Als je een actieve zwangerschapswens hebt, bespreek dat dan met je behandelende arts.

Vrouwen mogen **geen borstvoeding** geven tijdens de behandeling met dasatinib.

08 GENEESMIDDELEN EN ANDERE PRODUCTEN DIE JE NIET MAG COMBINEREN MET DASATINIB

Het gelijktijdig gebruik van sommige andere geneesmiddelen kan de hoeveelheid dasatinib in je bloed verhogen of verlagen. Hierdoor kan je meer last krijgen van bijwerkingen of kan het effect van dasatinib verminderen. Ook dasatinib zelf kan de hoeveelheid van andere geneesmiddelen in het bloed verhogen.

Voor je een behandeling met dasatinib start, moet je je arts of apotheker melden welke andere medicijnen je gebruikt. Dat geldt ook voor kruidenpreparaten en geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen.

We kijken na of je thuismedicatie kan interageren met dasatinib. Als dat zo is, moet jouw thuismedicatie mogelijk aangepast worden. Dan brengen we jou daarvan op de hoogte.

Als je een geneesmiddel neemt of wil gebruiken dat voorkomt in onderstaande lijst, geef dat dan zeker door aan je arts, huisarts of de ziekenhuisapotheker! Onderstaande lijst vermeldt niet alle producten, dus meld zeker ook alle wijzigingen in je thuismedicatie. Als je (huis)arts nieuwe medicatie voorschrijft, vraag dan altijd of er geen wisselwerking is met dasatinib. Er zijn websites beschikbaar voor je arts waarop die dat kan controleren. Bij twijfel kunnen jij of je arts altijd contact opnemen met onze dienst.



Geef altijd alle medicatie, alle voedingssupplementen of andere homeopathische middelen door aan je arts of apotheker.

Geneesmiddelen die de hoeveelheid dasatinib in je bloed verhogen

- ▲ **Antischimmelmiddelen:** voriconazole (bv. Vfend®), fluconazole (bv. Diflucan®), itraconazole (Sporanox®), posaconazole (bv. Noxafil®)
- ▲ **Antivirale middelen:** ritonavir (bv. Norvir®, Kaletra®, Paxlovid®) ...
- ▲ **Antibiotica:** erythromycine (bv. Erythrocin®), clarithromycine (bv. Biclar®, Heliclar®)
- ▲ **Pompelmoes** in alle vormen: vers fruit, fruitsap (multivruchten) ... Neem geen supplementen in die mogelijk grapefruit (roze pompelmoes) of pompelmoes bevatten.

Geneesmiddelen die de hoeveelheid dasatinib in je bloed verlagen

- ▲ **Anti-epileptica:** carbamazepine (Tegretol®), fenytoïne (Diphantoïne®), fenobarbital (Gardenal®) ...
- ▲ **Antibiotica:** rifampicine (Rifadine®) ...
- ▲ **Kruiden:** bv. preparaten op basis van sint-janskruid (Hypericum perforatum) ...
- ▲ **Maagbeschermers:** (es)omeprazol(e) (bv. Sedacid®, Losec®, Nexiam® ...), pantoprazol(e) (Maalox Control® ...), lansoprazole (Dakar®), rabeprazol (Pariet®). Zie ook verder voor bijkomend advies.

Geneesmiddelen waarvan de hoeveelheid in het bloed kan verhogen door dasatinib

Diverse geneesmiddelen: pimozide (Orap®), ergotamine (Cafergot®), kinidine, terbinafine (Lamisil®) ...

Bijkomend advies voor vaak gebruikte en vrij te verkrijgen medicatie

Hieronder vind je advies rond veelgebruikte medicatie en hun wisselwerking met dasatinib. Deze informatie is bedoeld om, als je arts of apotheek bepaalde medicatie adviseert, te kijken of de medicatie geen problemen geeft bij inname van dasatinib. Opgelet, deze lijst is niet volledig!

Medicatie die het maagzuur vermindert

Dasatinib zal pas goed werken als er voldoende maagzuur aanwezig is. Neem daarom geen geneesmiddelen die het maagzuur verminderen. Als dat toch noodzakelijk is, bespreek de inname met je arts of de ziekenhuisapotheker. Vrij verkrijgbare medicatie tegen maagzuur zoals Gaviscon® en Rennie® kan je eventueel gebruiken, maar wacht minstens twee uur na de inname van dasatinib.

Voorbeelden van maagbeschermers zijn omeprazole (Losec®), esomeprazole (Sedacid®, Nexiam®), pantoprazole (Pantomed®) ...

Pijnstillers

- ▲ Sporadisch paracetamol innemen vormt geen probleem tijdens een behandeling met dasatinib. Als je paracetamol langdurig gebruikt, moet je dat wel bespreken met je arts.
- ▲ Je moet voorzichtig zijn met ontstekingsremmers (zogenaamde NSAID), omdat die het bloedingsrisico verhogen. Sporadisch gebruik vormt geen probleem, als je medische geschiedenis dat toelaat (bv. niet als je nierproblemen hebt).
- ▲ Vermijd acetylsalicylzuur (aspirine) door het hogere risico op bloedingen.
- ▲ Zwaardere pijnstillers van het type tramadol of morfinepreparaten hebben geen belangrijke wisselwerking met dasatinib. Als je arts dat voorschrijft, kan je dat advies volgen.

Voorbeeldproducten:

- ▲ NSAID: ibuprofen (Nurofen®), diclofenac, naproxen
- ▲ Tramadol: Contramal®, Tradonal®
- ▲ Morfinepreparaten: Oxycontin®, MS Contin®, Oxynorm® ...

Medicatie tegen de misselijkheid

Door de wisselwerking met dasatinib wordt het gebruik van domperidone (Motilium®) afgeraden. Als je misselijk bent kan je wel metoclopramide (Primperan®) gebruiken.

Medicatie bij diarree

Loperamide (Imodium®) of Tiorfix® vormt geen probleem voor je behandeling met dasatinib. Probiotica (Enterol®, Lacteol® ...) vermijd je beter.

Medicatie bij obstipatie

Het gebruik van laxemiddelen type Movicol® of Forlax® vormt geen probleem tijdens je behandeling met dasatinib.

Medicatie tegen cholesterol (statine-preparaten)

Als je arts zo'n behandeling opstart geniet pravastatine of rosuvastatine de voorkeur omdat die geen wisselwerking vertonen met dasatinib. Er is evenwel geen contra-indicatie voor de overige preparaten.

Antibiotica

Als je een infectie hebt en je arts vindt dat je een antibioticakuur nodig hebt, moet je dat uiteraard innemen. Meld wel aan je arts dat je dasatinib neemt, omdat sommige antibiotica een ongunstige wisselwerking hebben met dasatinib.

Antibiotica van het type amoxicilline of amoxicilline-clavulaanzuur vormen meestal geen probleem. Voorzichtigheid is geboden met antibiotica van het type clarithromycine. Bij twijfel kan de arts altijd contact opnemen met de dienst Hematologie.

Kruiden en voedingssupplementen

- ▲ Sint-janskruid: niet gebruiken tijdens je behandeling
- ▲ Pomпельmoes(sap): niet gebruiken tijdens je behandeling

09 VACCINATIES TIJDENS JE BEHANDELING MET DASATINIB

Hou er rekening mee dat vaccins tijdens je behandeling met dasatinib iets minder effectief kunnen zijn en je dus mogelijk wat minder beschermd bent door het vaccin dan een gezonde persoon. Toch raden we jou sowieso een pneumokokken-vaccin aan en een jaarlijkse toediening van het griepvaccin. Je naasten vragen beter een griepvaccin om zo ook jouw besmettingsrisico te verkleinen. Ook eventuele herhaalvaccins tegen COVID-19 (SARS-CoV2) worden aangeraden.

Vraag voor andere vaccins advies aan je arts.

Belangrijk:

- ▲ dode of geïnactiveerde vaccins houden geen risico in, maar zijn soms minder zinvol als je een actieve behandeling krijgt;
- ▲ levende vaccins raden we af tijdens je behandeling omdat die bij patiënten met een verminderde weerstand wel kunnen leiden tot besmettingen door het vaccin.

10 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is **enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent** (ingang 12, route 1570). Breng je identiteitskaart mee als je het geneesmiddel komt afhalen.

Dasatinib wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek:

- ▲ weekdays: van 8 tot 20 uur
- ▲ zaterdag: van 8 tot 12 uur en van 13 tot 16.30 uur
- ▲ zondag: van 8 tot 13 uur
- ▲ feestdagen:
 - maandag, vrijdag of zaterdag: van 8 tot 16.30 uur
 - dinsdag, woensdag, donderdag of zondag: van 8 tot 13 uur

Contactgegevens ziekenhuisapotheek:

Tel. +32 9 332 32 41

apotheek.info@uzgent.be

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Hemato-oncologie en stamceltransplantatie'.

VRAGEN? NOTEER ZE HIER

[illegible]

