

JOUW BEHANDELING MET CARBOPLATINE BIJ PROSTAATKANKER

01 INLEIDING

Je behandeling bestaat uit opeenvolgende cycli om de vier weken. Je arts beslist hoeveel cycli in totaal nodig zijn. Elke cyclus bestaat uit drie keer een wekelijkse chemotoediening in het dagziekenhuis en één rustweek.

Van zodra de volledige cyclus van vier weken is doorlopen start je met de volgende cyclus, op voorwaarde dat je bloedwaarden en algemene toestand in orde zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen we de toediening uitstellen.

02 ZO ZIET EEN CYCLUS VAN VIER WEKEN ERUIT

Dag 1

	Product	Vorm	Werking	Tijdstip of tijdsduur
1	Anti-emetica	Tablet	Tegen misselijkheid	Innemen één uur voor de start van de chemotherapie
2	Cortisone	Infuus	Tegen misselijkheid	15 min.
3	Carboplatine	Infuus	Chemotherapie	30 min.
4	Spoelvlloeistof	Infuus	Leiding naspoelen	15 min.

Verwijdering infuus

5	Litican®	Tablet	Tegen misselijkheid (indien nodig)	Innemen bij aanhoudende misselijkheid tot maximum 6 per dag, 30 minuten voor de maaltijd
6	Motilium®	Tablet	Tegen misselijkheid (indien nodig)	Innemen bij aanhoudende maaglast tot maximum 3 per dag

Dag 2 en 3

Neem 's ochtends één tablet **Medrol® 32 mg** (cortisone) in tegen misselijkheid. Je krijgt de medicatie mee naar huis op de dag van de behandeling.

Cortisone kan bijwerkingen veroorzaken. Meer informatie hierover vind je in de folder 'Algemene wegwijzer bij chemotherapie'. Je kan de folder online bekijken of downloaden op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Chemotherapie'.

Dag 8 en 15

Zoals dag 1

Dag 9+10 en dag 16+17


Zoals dag 2 en 3

Dag 22

Rustweek

In schemavorm

Week 1	Dag 1	Dag 2	Dag 3	Dag 4	Dag 5	Dag 6	Dag 7
Week 2	Dag 8	Dag 9	Dag 10	Dag 11	Dag 12	Dag 13	Dag 14
Week 3	Dag 15	Dag 16	Dag 17	Dag 18	Dag 19	Dag 20	Dag 21
Rustweek	Dag 22	Dag 23	Dag 24	Dag 25	Dag 26	Dag 27	Dag 28

 = chemotoediening in het dagziekenhuis

 = één tablet Medrol®

03 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN



Voldoende drinken



Voorgeschreven medicatie innemen



Bij koorts (38°C of meer):
binnenkomen via
de Spoedgevallendienst



Bij **nieuwe** of toegenomen klachten:
telefonisch contact opnemen (je vindt
het nummer in de opnamebrochure)

04 WELKE BIJWERKINGEN KAN JE VERWACHTEN?

Hieronder geven we enkel een opsomming van de mogelijke bijwerkingen die bij deze behandeling van toepassing zijn. Meer uitgebreide informatie over de bijwerkingen vind je in de brochure 'Algemene wegwijzer bij chemotherapie'. Je kan de folder online bekijken of downloaden op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Chemotherapie'.

Volgende bijwerkingen kan je ervaren:

- ▲ infuusreactie of allergische reactie
- ▲ koorts
- ▲ daling van het aantal witte bloedcellen (neutropenie)
- ▲ daling van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede)
- ▲ daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- ▲ irritatie of ontsteking van het mondslijmvlies (mucositis)
- ▲ misselijkheid en braken
- ▲ vermoeidheid
- ▲ wijzigingen in het stoelgangpatroon
- ▲ reuk- en smaakveranderingen
- ▲ droge huid
- ▲ verminderd gehoor of oorsuizen
- ▲ verminderde nierfunctie
- ▲ invloed op seksualiteit en intimiteit
- ▲ vruchtbaarheidsproblemen
- ▲ concentratie- en geheugenstoornissen