

JOUW BEHANDELING MET DOCETAXEL (TAXOTERE®) – WEKELIJKS

01 INLEIDING

Je behandeling bestaat uit opeenvolgende cycli om de zes weken. Je arts beslist hoeveel cycli in totaal nodig zijn. Elke cyclus bestaat uit vijf weken chemotherapie op een vaste dag in de week in het dagziekenhuis. De zesde week is een rustweek.

Van zodra de volledige cyclus van zes weken is doorlopen start je met de volgende cyclus, op voorwaarde dat je bloedwaarden en algemene toestand in orde zijn. Is dit niet het geval, dan kunnen we de toediening uitstellen.

Bij deze behandeling is **hoofdhuidkoeling mogelijk** om haaruitval te voorkomen.

02 ZO ZIET EEN CYCLUS VAN ZES WEKEN ERUIT

Dag 1

	Product	Vorm	Werking	Tijdstip of tijdsduur
1	Cortisone (Dexamethasone® 8 mg)	Tablet	Tegen allergische reactie en misselijkheid	Ongeveer 12 uur voor de toediening van de chemo
2	Docetaxel	Infuus	Chemotherapie	30 min.
3	Spoelvlloeistof	Infuus	Leiding naspoelen	15 min.
Verwijdering infuus				
4	Litican®	Tablet	Tegen misselijkheid (indien nodig)	Innemen bij aanhoudende misselijkheid tot maximum 6 per dag, 30 minuten voor de maaltijd met een beetje water
5	Motilium®	Tablet	Tegen misselijkheid (indien nodig)	Innemen bij aanhoudende maaglast tot maximum 3 per dag

Je behandelende arts schrijft **cortisone (Medrol® 8 mg)** voor. Dat neem je in voor de start van de chemotherapie en moet je **dagelijks verder innemen gedurende de behandeling zonder onderbreking**. Dus ook op de dag van de chemotherapie. Je neemt die medicatie het best 's ochtends in.

Cortisone kan bijwerkingen veroorzaken. Meer informatie hierover vind je in de folder 'Algemene wegwijzer bij chemotherapie'. Je kan de folder online bekijken of downloaden op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Chemotherapie'.

Dag 8, 15, 22 en 29

Zoals dag 1

Dag 36

Rustweek

03 BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN



Volgende drinken



Voorgeschreven medicatie innemen



Bij koorts (38°C of meer):
binnenkomen via
de Spoedgevallendienst



Bij **nieuwe** of toegenomen klachten:
telefonisch contact opnemen (je vindt
het nummer in de opnamebrochure)

04 WELKE BIJWERKINGEN KAN JE VERWACHTEN?

Hieronder geven we enkel een opsomming van de mogelijke bijwerkingen die bij deze behandeling van toepassing zijn. Meer uitgebreide informatie over de bijwerkingen vind je in de brochure 'Algemene wegwijzer bij chemotherapie'. Je kan de folder online bekijken of downloaden op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Chemotherapie'.

Volgende bijwerkingen kan je ervaren:

- ▲ infuusreactie of allergische reactie
- ▲ koorts
- ▲ daling van het aantal witte bloedcellen (neutropenie)
- ▲ daling van het aantal rode bloedcellen (bloedarmoede)
- ▲ daling van het aantal bloedplaatjes (trombocytopenie)
- ▲ irritatie of ontsteking van het mondslijmvlies (mucositis)
- ▲ misselijkheid en braken
- ▲ haarverlies (alopecia)
- ▲ vermoeidheid
- ▲ wijzigingen in het stoelgangpatroon
- ▲ reuk- en smaakveranderingen
- ▲ droge huid
- ▲ vochttopstapeling
- ▲ spier- en gewrichtsklachten
- ▲ tintelingen in de vingertoppen en tenen (polyneuropathie)
- ▲ nagelveranderingen
- ▲ invloed op seksualiteit en intimiteit
- ▲ vruchtbaarheidsproblemen
- ▲ concentratie- en geheugenstoornissen