

## NOTA'S

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

vu.: Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Januari 2024 – Versie 01 – Art. 030133

### Neus-, keel- en oorheelkunde

#### Allergieverpleegkundigen

T +32 (0)9 332 67 08 (van 8.30 tot 12.30 en 13.30 tot 16.30 uur)

E [allergie@uzgent.be](mailto:allergie@uzgent.be)

[www.uzgent.be/allergienetwerk](http://www.uzgent.be/allergienetwerk)

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.  
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd,  
opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar  
gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke  
toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent  
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent  
T +32 (0)9 332 21 11 | E [info@uzgent.be](mailto:info@uzgent.be)

[www.uzgent.be](http://www.uzgent.be)

Volg ons op



# ACARIZAX<sup>®</sup>

## IMMUNOTHERAPIE MET TABLETTEN



## ACARIZAX®

Acarizax® is een vorm van immunotherapie voor volwassenen en kinderen boven de vijf jaar die overgevoelig zijn aan de huisstofmijt. De tablet bevat een allergeenextract van de huisstofmijt. Met de therapie verminderen de allergiesymptomen.

### Start van de behandeling

De behandeling kan op elk moment opgestart worden.

De eerste tablet neem je in onder toezicht van een arts. Zo kan die mogelijke bijwerkingen onmiddellijk met je bespreken.

### Duur van de behandeling

De totale behandeling duurt drie jaar. Je komt elk jaar in de maanden maart en april op controle bij prof. dr. Philippe Gevaert of dr. Julie Willekens. Je krijgt dan ook de voorschriften voor de verdere behandeling.

### De tabletten innemen

De dosering van een tablet is hetzelfde voor volwassenen, kinderen en adolescenten. Je neemt **elke dag één tablet**.

Doe dit bij voorkeur **'s morgens**. Zorg ervoor dat je mond leeg is en leg de tablet onder je tong. Laat de tablet volledig oplossen en slik dan door.

### Tablet vergeten innemen?

Als je een tablet vergeet, kan je die later op de dag innemen.

Neem nooit een dubbele dosis om een vergeten tablet te compenseren.

### De behandeling tijdelijk stopzetten

Je arts kan beslissen om de behandeling een tijdje te onderbreken als dat nodig is, bijvoorbeeld bij bepaalde bijwerkingen, infectie met koorts, mondwonden (afters of problemen met de tanden) of een astma-aanval.

### Zwangerschap en borstvoeding

Er wordt geadviseerd niet te beginnen met immunotherapie als je zwanger bent. Borstvoeding geven terwijl je in behandeling bent, moet je met je arts bespreken.

### Mogelijke bijwerkingen

De meest voorkomende bijwerkingen zijn milde of matige keelpijn, hoofdpijn en jeuk in de mond. Om de prikkeling onder de tong te verminderen kan je een ijsklontje onder je tong plaatsen, gedurende minstens vijf minuten.

Zelden treden er ernstige bijwerkingen op zoals zwelling in de keel, moeite met slikken of ademen. Neem in die gevallen meteen contact op met een arts. De behandeling moet dan onmiddellijk beëindigd worden.

Zelden treden er ernstige bijwerkingen op zoals zwelling in de keel, moeite met slikken of ademen. Neem in die gevallen meteen contact op met een arts. De behandeling moet dan onmiddellijk beëindigd worden.

### Prijs

Heb je allergische astma en allergische rhinitis, dan betaal je 5,20 euro per maand of 15 euro per drie maanden.

Heb je allergische rhinitis zonder allergische astma, dan betaal je 69,60 euro voor 90 tabletten.

### Contactgegevens

Voor een afspraak voor de eerste inname kan je terecht bij:

#### Polikliniek NKO

- ▲ Dinsdag- en woensdagvoormiddag
- ▲ Ingang 50, routes 690 (balie) en 700 (allergielokaal)

#### Polikliniek Kindergeneeskunde

- ▲ Woensdagnamiddag
- ▲ Ingang 10, route 1002