

JOUW BEHANDELING MET ENTRECTINIB (ROZLYTREK®)

INHOUD

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Wat moet je doen bij een vergeten dosis?	5
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	6
09	Waar verkrijgbaar?	6

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Rozlytrek® gebruiken we voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk patiënten **met ROS1-positief** gevorderd niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC). Dat betekent dat je kankercellen een verandering hebben in een gen met de naam ROS1. Rozlytrek® remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een specifieke stof in sommige kankercellen.

Rozlytrek® bevat de werkzame stof entrectinib.

02 INNAME

Volg de instructies van je behandelende arts.

Neem **één keer per dag 3 capsules van 200 mg** in met water (totale hoeveelheid 600 mg), al dan niet bij het eten. Neem ze elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

De duur van de behandeling hangt af van hoe je de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms is een dosisverlaging of zelfs tijdelijke therapiestop nodig omdat de bijwerkingen hinderlijk zijn. Die beslissing gebeurt altijd in overleg met de behandelende arts.

03 PLETTEN / BREKEN

Slik elke capsule in zijn geheel door. De capsules niet openen, vermalen of kauwen voor het doorslikken. Je kan zelf kiezen of je ze bij het eten inneemt of niet.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor je een behandeling met Rozlytrek® start, moet je je arts of apotheker melden welke andere geneesmiddelen je gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Rozlytrek® verminderen of de kans op bijwerkingen verhogen. Dat geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen.

We kijken na of je thuismedicatie kan interageren met Rozlytrek®. Als dat zo is, moet jouw thuismedicatie mogelijk aangepast worden. Dan brengen we jou daarvan op de hoogte.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN

- ▲ Je mag **geen pompelmoessap** drinken en geen pompelmoes of bittere (Sevilla-)sinaasappelen eten. Dat kan de hoeveelheid geneesmiddel in je bloed namelijk doen stijgen tot een schadelijk niveau.
- ▲ Je mag **niet zwanger worden** als je dit geneesmiddel gebruikt, want het kan schadelijk zijn voor de baby. Ben je een vrouw in de vruchtbare leeftijd, dan moet je vanaf de start van de behandeling tot ten minste **vijf weken** na de laatste dosis Rozlytrek® heel effectieve **anticonceptie** gebruiken. Het is niet bekend of dit middel de werking remt van anticonceptie (de pil of middelen die in je lichaam hormoon afgeven). Gebruik daarom nog een andere betrouwbare methode van anticonceptie zoals condooms. Mannen met een vrouwelijke partner in de vruchtbare leeftijd moeten tijdens de behandeling en tot ten minste **drie maanden** na de laatste dosis Rozlytrek® effectieve anticonceptie gebruiken. Bespreek met je arts wat de beste anticonceptiemethoden zijn voor jou en je partner.
- ▲ Word je toch zwanger tijdens het gebruik van dit geneesmiddel of in de vijf weken na de laatste dosis? Vertel dat dan meteen aan je arts.
- ▲ Geef **geen borstvoeding** tijdens het gebruik van Rozlytrek®. Het is namelijk niet bekend of het in de moedermelk terecht kan komen en daardoor schadelijk kan zijn voor je baby.
- ▲ Dit geneesmiddel kan invloed hebben op je rijvaardigheid en op je vermogen om machines te bedienen. Je kan last krijgen van:
 - wazig zien
 - duizeligheid
 - flauwvallen (bewusteloosheid)
 - vermoeidheid
 - veranderingen in je mentale toestand, verwardheid of dingen zien die er niet zijn (hallucinaties)**Als dat gebeurt, mag je geen voertuigen besturen**, niet fietsen of zware machines bedienen totdat de klachten verdwenen zijn. Bespreek met je arts of apotheker wat wel of niet kan.
- ▲ Rozlytrek® bevat:
 - **lactose** (een soort suiker). Als je bepaalde suikers niet verdraagt, neem dan contact op met je arts voordat je dit middel inneemt.
 - **zonnegeel FCF (E110)**, alleen in de harde capsules van 200 mg. Dat is een kleurstof die allergische reacties kan veroorzaken.

06 WAT MOET JE DOEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS?

- ▲ Is je volgende dosis meer dan 12 uur later? Neem dan de vergeten dosis in zodra je eraan denkt.
- ▲ Is de volgende dosis minder dan 12 uur later? Neem dan de vergeten dosis niet meer in. De volgende dosis neem je gewoon op het gebruikelijke tijdstip in. Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.
- ▲ Als je direct na de inname van Rozlytrek® moet braken, neem dan een nieuwe dosis in.
- ▲ Heb je te veel van dit middel ingenomen? Neem direct contact op met een arts of ga direct naar een ziekenhuis. Neem de verpakking van het geneesmiddel en de bijsluiter mee.
- ▲ Vind je het lastig om dit geneesmiddel te blijven innemen door mogelijke bijwerkingen? Hou vol. Stop nooit zonder dat eerst met je arts te bespreken. Je moet dit geneesmiddel elke dag innemen zolang als je arts dat voorschrijft.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

Vertel het direct aan je arts als je een of meer van de onderstaande bijwerkingen krijgt na gebruik van dit geneesmiddel. Je arts kan je dosering verlagen, je behandeling voor korte tijd onderbreken of je behandeling volledig stoppen.

Dit kan je ervaren:

- ▲ Je moet hoesten, bent kortademig en hebt opgezwollen benen of armen (vochtophoping).
- ▲ Je bent verward, hebt last van stemmingsveranderingen, geheugenproblemen of je ziet dingen die er niet zijn (hallucinaties).
- ▲ Je voelt je duizelig of licht in je hoofd, of je voelt je hart onregelmatig of sneller kloppen.
- ▲ Je hebt pijn in je gewrichten, botpijn, misvormingen of een veranderde manier van bewegen.
- ▲ Je hebt nierproblemen of een gewrichtsontsteking (artritis).

08 BEWARING

- ▲ Buiten het zicht en bereik van kinderen houden.
- ▲ Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Die vind je op de doos en de fles na 'EXP'.
- ▲ Bewaar dit geneesmiddel in de oorspronkelijke verpakking en houd de fles zorgvuldig gesloten om de inhoud te beschermen tegen vocht.
- ▲ Spoel geneesmiddelen niet door de wasbak of het toilet en gooi ze niet in de vuilnisbak. Vraag je apotheker wat je met geneesmiddelen moet doen die je niet meer gebruikt.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng je identiteitskaart mee als je het geneesmiddel komt afhalen.

Rozlytrek® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

- ▲ maandag tot vrijdag: 8-20 uur
- ▲ zaterdag: 8-12 uur en 13-16.30 uur
- ▲ zondag: 8-13 uur
- ▲ feestdagen:
 - maandag, vrijdag of zaterdag: 8-16.30 uur
 - dinsdag, woensdag, donderdag of zondag: 8-13 uur

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Thoracale oncologie'.

VRAGEN? NOTEER ZE HIER

[illegible]