

CELLCEPT®

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE

01	Inleiding	3
02	Werking en dosering	3
03	Adviezen bij de Inname van Cellcept®	3
04	Bijwerkingen	4

01 INLEIDING

In deze brochure kan u informatie terugvinden over Cellcept®, geven we enkele belangrijke aandachtspunten mee over de inname en welke bijwerkingen eventueel kunnen voorkomen.

02 WERKING EN DOSERING

Het werkzame bestanddeel van Cellcept® is mycofenolaat mofetil. Cellcept® is verkrijgbaar in verschillende doseringen; 500 mg - 250 mg.

Bewaar de medicatie in de originele verpakking op kamertemperatuur.

03 ADVIEZEN BIJ DE INNAME VAN CELLCEPT®

De inname van Cellcept® moet zeer **nauwkeurig** gebeuren.

- Cellcept® wordt meestal 3 x per dag en +/- 30 min vóór het eten ingenomen. De eerste dosis van de dag wordt ingenomen voor het ontbijt. De andere dosissen neemt u in op de voorgeschreven tijdstippen.
- De doseringen van Cellcept® kunnen in de loop van de dag verschillen. Het is van belang om het voorschrift van uw arts nauwgezet op te volgen.
- U neemt de medicatie best pas uit de verpakking vlak voor de inname ervan. Was steeds uw handen met water en zeep voor en na inname van de medicatie. Probeer de medicatie zo weinig mogelijk aan te raken.
- Slik de capsules of tabletten in hun geheel door met een glas water (zonder te openen, op te lossen of te pletten).

- Het is aangewezen dat zwangere vrouwen deze medicatie niet aanraken.
- Buiten het bereik van kinderen bewaren.

04 BIJWERKINGEN

Het is mogelijk dat er bijwerkingen optreden bij de inname van Cellcept®. De intensiteit en aard van deze bijwerkingen verschilt van persoon tot persoon. Het is steeds belangrijk om uw arts, verpleegkundige of apotheker op de hoogte te brengen als u bepaalde bijwerkingen ervaart.

De medicatie kan beven van de ledematen (vooral de handen), duizeligheid en/of hoofdpijn veroorzaken. Dit komt vaker bij het begin van de behandeling of wanneer de dosis iets te hoog is. U kan mogelijks ook **spier- en gewrichtspijnen** ervaren.

Verminderd aantal bloedcellen

Cellcept® kan aanleiding geven tot een verlaagd aantal bloedplaatjes, rode en witte bloedcellen. Dit evenwicht wordt nauwkeurig in de gaten gehouden via bloedafnames. Uw arts volgt dit op en past eventueel de dosis aan.

Huidaandoeningen

Uw medicatie kan problemen ter hoogte van de huid veroorzaken zoals acne, koortsblaasjes en/of jeuk.

Maag- en darmproblemen

Bij de inname van Cellcept® kan u buikkrampen, maagkrampen of diarree ervaren. Het is belangrijk dat u zelf voldoende blijft drinken, **minimum 2 liter vocht (bv. water, soep, sportdranken, thee enz...)** per dag. Bij warm weer, koorts of op aanraden van uw arts kan dit nog verhogen. Indien nodig zal uw arts medicatie opstarten.