

CERITINIB

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE / INHOUD(SOPGAVE)

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	5
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	6
09	Waar verkrijgbaar?	6

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Ceritinib wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Ceritinib blokkeert de werking van een bepaalde stof in sommige kankercellen en remt zo de groei en verspreiding van de kankercellen.

Ceritinib is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam:

02 INNAME

Neem eenmaal per dag drie capsules (450mg) ceritinib van 150mg in zijn geheel in met een half glas water, **met voedsel** (bijvoorbeeld een snack of een volledige maaltijd). Het is belangrijk om dit elke dag op hetzelfde tijdstip te doen. Indien nodig kan uw arts de dosering verlagen.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

03 PLETTEN / BREKEN

U mag de capsules NIET kauwen, NIET openen, NIET pletten en NIET oplossen.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met ceritinib start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van ceritinib verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Uw thuismedicatie zal bevestigd worden door een medewerker van de ziekenhuisapotheek, eventueel telefonisch. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

!

- Gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid, dit kan de werking van ceritinib nadelig beïnvloeden.
- Drink geen pompelmoessap of eet geen pompelmoes tijdens uw behandeling met ceritinib. De hoeveelheid ceritinib in uw lichaam kan hierdoor namelijk veranderen.
- Als u orale anticonceptiva gebruikt en ceritinib inneemt, kunnen de orale anticonceptiva minder effectief zijn.
- Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 3 maanden na de behandeling met ceritinib. Bespreek met uw arts wat de beste anticonceptiemethoden voor u en uw partner zijn.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS



Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen:

- Als het meer dan 12 uur duurt tot uw volgende dosis, neem dan de vergeten dosis in zodra u zich dit herinnert.
- Als het minder dan 12 uur duurt tot uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over. Neem uw volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Meld een niet-ingenomen dosis steeds bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

Als u braakt nadat u ceritinib heeft ingenomen, neem dan geen extra dosis in. Neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- Buikpijn, misselijkheid, braken
- Diarree
- Obstipatie
- Slokdarmaandoeningen
- Vermoeidheid
- Verminderde eetlust, gewichtsverlies
- Huiduitslag
- Afwijkende leverfunctiewaarden en nierfunctiewaarden bij bloedonderzoek

Telefoonnummer verpleegkundig consulent oncologie: +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Ceritinib moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Ceritinib wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 13u-16u30
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.