

Aan te raden vaccinatie vóór start immunosuppressieve therapie
(aanduiden wat telt)

- Hepatitis B
- HPV (<18 jaar)
- Varicella
- Mazelen (+ Bof/Rubella)
- Gele koorts
- Cfr algemene populatie: Boost Tetanus/Difterie/Pertussis

Verrichte vaccinatie (datum) : voor starten immunosuppressieve therapie

- Hepatitis B :
- HPV :
- Varicella :
- Mazelen (+ Bof/Rubella):
- Gele koorts :


Aan te raden vaccinaties bij gebruik immunosuppressiva en biologicals

- Influenza : jaarlijks
- Pneumococcen
 - Geconjugerd polysaccharide (*Synflorix® of Prevenar 13®*) :
éénmalig : datum vaccinatie
 - Na 8 weken : Polysaccharide vaccin (*Pneumo 23®*):
5-jaarlijks te herhalen : datum eerste vaccinatie

Inventaris ernstige/bijzondere infecties tijdens verloop ziekte

- Datum :
 - Omschrijving.....
- Datum :
 - Omschrijving

Vaccines in IBD Patients



* This delay may be reduced to 1 month in case of use of corticosteroids alone

IS = immunosuppressant; DTP = diphtheria/tetanus toxoids and pertussis vaccine; HPV = human papillomavirus vaccine; MMR = measles, mumps and rubella vaccine; VZV = varicella-zoster virus vaccine.

Chemoprophylaxis

- TB: according to national guidelines
- *Pneumocystis jiroveci* prophylaxis:
 - Triple chronic immunosuppression including a calcineurin inhibitor or a TNF inhibitor
 - Cotrimoxazole (Trimethoprim-sulfamethoxazole) (160–800 mg tablet, 3 times a week) [EL4,RGD]
- Frequent (>4/year) and/or severe recurrences of herpes simplex:
 - Oral acyclovir (400 mg bid) or valacyclovir (500mg)
- Strongyloidiasis (*Strongyloides stercoralis*):
 - Travel in endemic countries (tropics, Appalachians)
 - Screen for hypereosinophilia and serological testing
 - If positive: ivermectin