

Waarom is een tijdige diagnose zo belangrijk?

Een tijdige diagnose vermindert de kans op een allergische reactie in het dagelijks leven en bij medische verzorging. Aangezien sommige medische materialen latex bevatten, lopen niet-geïdentificeerde patiënten het risico dat een operatie op het laatste moment uitgesteld moet worden, of dat er zich tijdens de operatie een reactie voordoet. De bevraging helpt om u een efficiënte behandeling op maat te geven.

Voorzorgsmaatregelen

Als u de diagnose latexallergie kreeg, moet u contact met latex zoveel mogelijk vermijden.

Producten die meestal latex bevatten:

- ▲ Latex handschoenen
- ▲ Condoom en pessarium
- ▲ Ballonnen
- ▲ Kleding: elastiek in ondergoed, beha en korsetten, latex lingerie, elastische steunkousen, gymschoenen, laarzen, regenjassen en badpak.
- ▲ Sportartikelen: bal, atletiekmat
- ▲ Huishoudelijke artikelen: warmwaterkruik, huishoudhandschoenen, elastiekjes
- ▲ Overige: spenen van babyflesvoeding en fopspenen, luchtbed

Mensen met latexallergie kunnen ook een allergische reactie krijgen als ze bepaalde tropische fruitsoorten eten. Dit noemen we het latex-fruit syndroom. Als u in het verleden een allergische reactie had bij het eten van banaan, kiwi, avocado, kastanje of papaja, krijgt u de raad om die fruitsoorten te vermijden.

Latex wordt ook gebruikt in medisch materiaal, daarom is het belangrijk dat u uw allergie steeds vermeldt als u bij de dokter komt. Overhandig dan ook een gedocumenteerd bewijs (allergiepas of doktersbrief).

Weet u niet zeker of u een latexallergie hebt, dan onderzoeken we dat voor een operatie.

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Neveland Graphics cvba-so – 338626 – Mei 2018 – Versie 3

Allergienetwerk

Coördinator

prof. dr. Philippe Gevaert

Allergieverpleegkundige

mevr. Patricia Oosterlinck

Centraal allergietelefoonnummer

+32 (0)9 332 67 08

E-mailadres verpleegkundige

patricia.oosterlinck@uzgent.be

Algemeen e-mailadres

allergie@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoerd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



LATEXALLERGIE



LATEXALLERGIE

Latex en latexallergie

Latex is een natuurrubber dat geproduceerd wordt uit het melkachtige sap van de rubberboom. Latex is verwerkt in heel wat gebruiksartikelen zoals huishoudhandschoenen, ballonnen, fopspenen, speelgoed, luchtbedden, sportartikelen, condooms en soms ook medisch materiaal. Om het productieproces te versnellen en het product sterker, soepeler en langer houdbaar te maken, worden chemische additieven toegevoegd. Mensen kunnen allergisch reageren op de eiwitten van natuurrubber en/of op de toegevoegde chemicaliën. De klachten kunnen variëren van lokale huiduitslag, neus- en oogklachten, astma tot zelfs anafylactische shock.

Type I latexallergie

Type I latexallergie is een reactie van het immuunsysteem op de eiwitten in natuurlijk rubber en geeft een variatie aan klachten die onmiddellijk tot snel optreden. Tot de symptomen behoren netelroos (urticaria), allergische neus- en oogklachten, astma, latex-fruitsyndroom en allergehande veralgemeende reacties (allergische reacties die over het volledige lichaam verspreid kunnen zijn). Veralgemeende reacties kunnen fataal zijn als ze niet juist behandeld worden. De symptomen variëren naargelang de route van blootstelling (via de huid, slijmvliezen of de longen), de hoeveelheid allergeen en individuele factoren.

Type IV of contactallergisch eczeem

Type IV of contactallergisch eczeem is veeleer een immunologische reactie op de chemische rubberadditieven dan op het natuurlijk rubber zelf. Dit is een relatief milde contactallergie die leidt tot vertraagde huiduitslag. De symptomen zijn eczeem van de huid bestaande uit netelroos (urticaria), bultjes en/of blaasjes, roodheid en jeuk.

Let wel: irritatie-eczeem of irritant contact dermatitis is geen latexallergie. Deze vaak voorkomende huiduitslag is geen reactie van het immuunsysteem, maar is het resultaat van veelvuldig handen wassen en onvoldoende afdrogen, gebruik van ontsmettende producten en/of wrijvingsirritatie door het poeder in latexhandschoenen. De handen zijn geïrriteerd, droog, jeuken en vertonen vaak scheurtjes van de huid.

Hoe weet ik of ik latexallergie heb?

Om een eventuele latexallergie vast te stellen, zal uw zorgverstreker u enkele sleutelvragen stellen:

Heeft u na contact met latex (dragen van latexhandschoenen, contact met condoom, opblazen van een ballon...) of het eten van banaan, kiwi, avocado, kastanje of papaja last van:

- ▲ Gezwollen ogen, lippen, handen?
- ▲ Kortademigheid?
- ▲ Neus- en/of oogklachten?
- ▲ Huiduitslag?

Risicogroepen

Bepaalde groepen die regelmatig met latex in aanraking komen, hebben meer kans om een latexallergie te ontwikkelen.

- ▲ Patiënten met uro-genitale afwijkingen
- ▲ Patiënten met spina bifida
- ▲ Kinderen die voor de leeftijd van 1 jaar frequent geopereerd werden
- ▲ Zorgverleners
- ▲ Arbeiders in de rubberindustrie

- ▲ Mensen met ernstige allergische reacties op kiwi, banaan, avocado, noten en papaja (in zuivere of verwerkte vorm). De eiwitten in deze fruitsoorten gelijken op de proteïnen in latex zodat het lichaam een gelijkaardige reactie kan vertonen.
- ▲ Mensen met een voorgeschiedenis van onverklaarbare anafylactische reactie

Waarheen?

Als uw arts vermoedt dat u een latexallergie heeft, maakt u een afspraak op de dienst Dermatologie.

Uitwerking
latexallergie



Dienst
Dermatologie

Arts: prof. dr. Hilde Lapeere - dr. Annelies Stockman
Receptie: 09 332 22 87

Opgelet: om een afspraak te maken, hebt u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

Zorgtraject

Het zorgtraject start bij de huisarts, bij uw behandelend specialist, op de verpleegafdeling of op de preoperatieve consultatie. Als u positief antwoordt op één of meerdere van de sleutelvragen, volgt een bloedafname. Indien nodig, verwijzen we u naar de dienst Dermatologie waar u verder onderzocht wordt.

Opgelet: het is belangrijk dat u 4 à 5 dagen voor de consultatie stopt met de inname van antihistaminica. Als latexallergie bevestigd wordt, noteren we dat in uw dossier en krijgt u een latexallergiepas mee. Deze pas geldt als gedocumenteerd bewijs dat u bij een volgende afspraak of ingreep voor kunt leggen.