



# Belang keuze katheter

## Indeling volgens tippositie/duur van de therapie

www.bevanet.be





**Indicaties:**

- therapie +/- 4 weken
- streven naar uitsluitend intramuraal gebruik

- Hemato: volledige duur van de therapie

**Indicaties:**

- therapie < of = 4 maanden
- chemotherapie < of = 6 maanden
- intermittente (dagelijks/ wekelijks) therapie
- tijdelijke TPN
- regelmatige bloedafnames

**Contra-indicaties:**

- (bilaterale) axilla-uitruiming
- lymfe-oedeem
- arterio-veneuze shunt
- huidbeschadiging thv mogelijke insteekplaats: (brand)wonde, stralingsschade, huidinfectie
- (eerdere trombose op PICC)
- flebitis, stenose of variceus verloop van puncteerbare armvenen

**Voordeel patiënt:**

- te verwijderen door vpk
- veilige toediening in de thuiszorg

**Nadeel patiënt:**

- extern stuk katheter: niet zwemmen of baden
- Groter risico op trombose

**Indicaties:**

- therapie > 6 maanden
- continue therapie
- continue TPN
- Corpulente patiënten met een subcutane vetmassa > 30mm vanaf fascia borstspier

**Indicaties:**

- therapie > 4 maanden
- intermittente (wekelijks/maandelijks) therapie
- regelmatige bloedafnames
- Patiënten met slechte persoonlijke hygiëne

**Contra-indicaties:**

- corpulente patiënten

**Voordeel patiënt:**

- zwemmen en baden is mogelijk

**Nadeel patiënt:**

- chirurgische verwijdering
- groter risico op extravasatie
- percutaan aan te prikken