

# VELCADE – DEXAMETHASONE

---

KANKERCENTRUM  
UZ GENT



---

## INHOUDSTAFEL

01	Welke chemotherapie (=cytostatica) krijgt u?	3
02	Vorbereiding en verloop van de behandeling	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Onderzoeken	4
05	Medicatie	5
06	Bijwerkingen	5

# 01 WELKE CHEMOTHERAPIE (=CYTOSTATICA) KRIJGT U?

Uw behandeling bestaat uit 2 producten: Velcade® (Bortezomib) en Dexamethasone, dit kan ook afgekort worden als VD.

Bortezomib, met als merknaam Velcade®, is een doelgerichte therapie. Het geneesmiddel zal de afbraak van eiwitten in de cel verstoren. Zo ontstaat er een overaanbod aan eiwitten, waardoor de kankercellen onvoldoende bouwstoffen hebben om te overleven. Het onevenwicht zorgt dus voor het afsterven van de kankercellen.

Dexamethasone of Aacidexam® is géén cytostaticum (= celdodend middel), maar wel een cortisoneafgeleide.

Generische naam	Vb. specialiteitsnaam	Specifieke werking
<b>Bortezomib</b>	Velcade®	Proteasoomremmer
<b>Dexamethasone</b>	Aacidexam®	Glucocorticosteroïden

# 02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Een deel van deze behandeling, namelijk Velcade® wordt op de dagkliniek (ingang 12, route 1323) toegediend via een onderhuidse inspuiting (SC). Bij een opname op de dagkliniek komt u steeds terecht op een 2-persoonskamer. 's Middags krijgt u op de afdeling een lunchpakket aangeboden. U hoeft vooraf niet nuchter te zijn, een lichte maaltijd die dag kan zelfs aangewezen zijn om misselijkheid te voorkomen.

Bij de start van iedere chemotherapie wordt een bloedafname uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten kan de therapie opgestart, maar ook uitgesteld worden naar een later moment (dit in overleg met de arts).

Voor de toediening van Velcade® krijgt u medicatie (Litican®) toegediend in pilvorm (PO) om misselijkheid en braken te voorkomen. Deze mag u thuis verder innemen indien nodig ongeveer 30 minuten voor iedere maaltijd.

Dexamethasone dient u thuis in pilvorm in te nemen.

Naast de Dexamethasone en Velcade® zal uw arts u nog andere ondersteunende medicatie voorschrijven. Hiervoor verwijzen we graag naar het medicatierooster dat u van uw arts zal ontvangen.

## 03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

Eén cyclus omvat 21 dagen (= 3 weken) behandeling, tijdens deze 3 weken wordt u in de 1<sup>ste</sup> en 2<sup>de</sup> week verwacht op de dagkliniek voor uw Velcade® toediening (2x/week). De 3<sup>de</sup> week hoeft u niet naar het ziekenhuis te komen en moet u enkel uw Dexamethasone innemen op de afgesproken dagen. De VD-kuur bestaat uit minstens 4 opeenvolgende cycli.

Uw behandeling op de dagkliniek ziet er als volgt uit:

	Product	Vorm	Werking	Tijdstip of tijdsduur
1	Dexamethasone	PO	Glucocorticosteroiden	Mag thuis ingenomen worden
2	Litican 100 mg	PO	Tegen de misselijkheid	In te nemen voor Velcade
3	<b>Velcade</b>	<b>SC</b>	<b>Proteasoomremmer</b>	<b>5 min.</b>

## 04 ONDERZOEKEN

Uw arts bepaalt wanneer er een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden. Enkele frequent voorkomende onderzoeken zijn:

- Een bloedonderzoek
- Een beenmergonderzoek (bij evaluatie van effect therapie )
- Een NMR-scan, RX- of CT-scan van het volledige lichaam (bij evaluatie van effect therapie)

## 05 MEDICATIE

Informeer steeds uw behandelende arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt!

- ⇒ **Zowel de geneesmiddelen die worden voorgeschreven, als de (genees)middelen die u zonder voorschrift gebruikt (bv. Kruidenpreparaten of vitamines)!**

## 06 BIJWERKINGEN

Chemotherapie werkt vooral in op sneldelende cellen, dus naast kankercellen worden ook een deel gezonde cellen aangevallen. Hierdoor kunnen bijwerkingen optreden. Een deel van de bijwerkingen kan bestreden worden met medicijnen. De bijwerkingen verminderen meestal geleidelijk nadat uw behandeling is beëindigd.

### Bortezomib - Velcade®

Enkele bijwerkingen die mogelijks kunnen optreden tijdens de behandeling met Velcade® zijn:

- Vermoeidheid
- Maag- en darmproblemen: Misselijkheid, braken, diarree, constipatie
- Onderdrukking van de bloedplaatjes
- Zenuwontstekingen (= perifere neuropathie): Onprettig, prikkelend, tintelend, brandend gevoel, dat pijnlijk kan zijn of kan leiden tot een verminderde gevoeligheid in handen of voeten

### Dexamethasone - Aacidexam®

Enkele bijwerkingen die zich mogelijks kunnen voordoen gedurende de behandeling met Dexamethasone zijn:

- Maaglast
- Zenuwachtigheid
- Hyperactiviteit
- Vaak slapeloosheid

---

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is zeer individueel en persoonlijk! Veel hangt af van de soort en hoeveelheid chemotherapie die u krijgt. Iedereen reageert anders op de toediening.

!

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen hebben er minder last van. De bijwerkingen verdwijnen meestal na de behandeling. Belangrijk hierbij is dat de ernst van de bijwerkingen niets te maken heeft met het resultaat van de behandeling!

Het is belangrijk dat u steeds uw bijwerkingen vermeldt aan uw arts of verpleegkundige bij een volgend ziekenhuisbezoek. Op die manier kunnen er mogelijkheden gezocht worden om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.

---