

ALECTINIB (ALECENSA®)

KANKERCENTRUM



INHOUDSOPGAVE

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	3
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	6
09	Waar verkrijgbaar?	6

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Alecensa® wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Alecensa® remt de groei van de kankercellen door zich vast te hechten aan een specifieke stof in sommige kankercellen.

Alecensa® bevat de werkzame stof alectinib.



02 INNAME

Neem tweemaal per dag vier capsules (600mg) Alecensa® van 150mg in zijn geheel in met een glas water, **bij de maaltijd**. Dit betekent dat u in totaal 8 capsules (1200mg) inneemt per dag. Het is belangrijk om dit elke dag op hetzelfde tijdstip te doen. Indien nodig kan uw arts de dosering verlagen.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

03 PLETTEN / BREKEN

U mag de capsules NIET openen, NIET pletten of NIET oplossen.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met Alecensa® start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Alecensa® verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Uw thuismedicatie zal bevestigd worden door een medewerker van de ziekenhuisapotheek, eventueel telefonisch. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

- Gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid, dit kan de werking van Alecensa® nadelig beïnvloeden.
- Drink geen pompelmoessap of eet geen pompelmoes of zure sinaasappelen tijdens uw behandeling met Alecensa®. De hoeveelheid Alecensa® in uw lichaam kan hierdoor namelijk veranderen.
- Als u orale anticonceptiva gebruikt en Alecensa® inneemt, kunnen de orale anticonceptiva minder effectief zijn.
- Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 3 maanden na de behandeling met Alecensa®. Bespreek met uw arts wat de beste anticonceptiemethoden voor u en uw partner zijn.
- Ga niet voor een lange periode in de zon terwijl u Alecensa® neemt en gedurende 7 dagen nadat u bent gestopt. U moet zonnebrandcrème en lippenbalsem gebruiken met een beschermingsfactor (SPF) van 50 of hoger om zonnebrand te helpen voorkomen.
- De aanbevolen dagelijkse dosering van Alecensa® (1200 mg) bevat 48 mg natrium. Houd rekening met deze hoeveelheid als u een zoutarm dieet heeft.
- Neem dit geneesmiddel niet als u lactose-intolerant bent.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen.

Bent u vergeten dit middel in te nemen:

- Als het meer dan 6 uur duurt tot uw volgende dosis, neem dan de vergeten dosis in zodra u zich dit herinnert.
- Als het minder dan 6 uur duurt tot uw volgende dosis, sla dan de vergeten dosis over. Neem uw volgende dosis in op het gebruikelijke tijdstip.
- Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Meld een niet-ingegenomen dosis steeds bij uw volgende ziekenhuisbezoek.

Als u braakt nadat u Alecensa® heeft ingenomen, neem dan geen extra dosis in. Neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

Neem onmiddellijk contact op met de arts als u één van volgende ernstige bijwerkingen vertoont:

- Geel worden van uw huid of het wit van uw ogen, pijn aan de rechterzijde van uw maagstreek, donkere urine, jeukende huid, verminderde eetlust, misselijkheid of braken, moe, sneller bloedingen of blauwe plekken (mogelijke symptomen van leverproblemen)
- Nieuwe of verergerde symptomen van spierproblemen, zoals onverklaarbare spierpijn of spierpijn die niet weggaat, gevoeligheid of zwakte
- Flauwvallen, duizeligheid en lage bloeddruk (mogelijke symptomen van een vertraagde hartslag)
- Nieuwe of verergerde ademhalingsproblemen zoals moeite met ademen, kortademigheid, hoesten met of zonder slijm, of koorts. Alecensa® kan tijdens de behandeling een ernstige of levensbedreigende ontsteking van de longen veroorzaken.

Overige vaak voorkomende bijwerkingen:

- Misselijkheid en braken
- Obstipatie
- Diarree
- Gewichtstoename en oedeem
- Huiduitslag

Telefoonnummer verpleegkundig consulent: +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Alecensa® moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Alecensa® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 13u-16u30
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.