

Kan men recidieven voorkomen?

Het wordt aangeraden om recidieven vroegtijdig aan te pakken, zo nodig in meerdere opeenvolgende sessies. Sexueel contact met personen die zelf condylomen hebben is sterk af te raden om een herinfectie te voorkomen.

Ook de partner(s) van de patiënt wordt aangeraden zich te laten onderzoeken op genitale of anale wratten.



Anale condylomen

- ┌ Wratachtige huidletsels
- ┌ SOA
- ┌ HPV virus
- ┌ Geen pijn, geen jeuk

Wat zijn anale condylomen?

Condylomen zijn wratachtige huidletsels, veroorzaakt door een virus (HPV of Human Papilloma Virus). Ze kunnen overal voorkomen maar vooral op de geslachtsorganen, en ook ter hoogte van de anale huid.

Aanvankelijk gaat het over kleine letseltjes, maar onbehandeld kunnen ze tot meerdere centimeters groot worden. De letsels veroorzaken geen pijn of jeuk en het kan een tijdje duren vooraleer men

voelt dat men condylomen heeft. Helaas zullen ze blijven groeien en zijn condylomen overdraagbaar via direct contact dikwijls bij seksuele betrekkingen.

Anus



Penis



Vulva

Moet men condylomen verwijderen ?

Ja. De wratten groeien mettertijd in aantal en afmeting, en verhogen de besmettelijkheid. Uitzonderlijk worden deze wratten kwaadaardig indien ze gedurende lange tijd onbehandeld blijven groeien.

Hoe worden ze verwijderd?

Er bestaan zalven om vooral de kleine condylomen rond de anus te behandelen. Deze zijn echter duur, kunnen lokale irritatie veroorzaken en vereisen ook een nauwkeurig opvolgen van de medische voorschriften. Het aanbrengen gebeurt onder strikt medisch toezicht en wordt gedurende meerdere weken aangehouden.

Condylomen kunnen eveneens heelkundig worden verwijderd of door gebruik te maken van elektrische verbranding (fulgurisatie), laser of bevrozingstherapie. Deze verschillende methoden zijn vergelijkbaar qua ongemak en effectiviteit. De ingreep kan onder lokale verdoving gebeuren maar ook locoregionale (ruggeprik) en algemene anesthesie is mogelijk, dit in functie van de uitgebreidheid van de letsels.

Condylomen die in het binnenste van het anaal kanaal groeien, worden meestal chirurgisch weggesneden onder algemene verdoving.

Moet je hiervoor gehospitaliseerd worden?

Doorgaans kan de ingreep in daghospitaal gebeuren. De werkbekwaamheid na de ingreep hangt af van persoon tot persoon, maar ook van de uitgebreidheid van de ingreep, maar is meestal minder dan één week.

Is de behandeling definitief?

Spijtig genoeg hebben condylomen de neiging terug op te duiken, vooral dan bij patiënten met een probleem van immuniteit (HIV, transplantatie). Het virus dat verantwoordelijk is voor de condylomen vindt in de gezond uitziende huid rondom de aangetaste plek een veilig onderkomen. Nieuwe condylomen kunnen soms na één maand al terug te zien zijn. Deze kunnen dan gelukkig weer opnieuw met eenzelfde behandeling verwijderd worden, daarom wordt een frequente opvolging aangeraden.