

Meer informatie

- ▲ Bewaar uw medicijnen altijd waar kinderen er niet bij kunnen.
- ▲ Wees voorzichtig met alcohol.
- ▲ Beperkt blootstelling aan de zon en gebruik zonnecrème.

Contacteer uw huisarts of uw behandelend neuroloog (09 332 45 29) bij vragen of bij neveneffecten/klachten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijsluiter. U vindt ook onafhankelijke informatie over geneesmiddelen op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be.

v.u.: Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 050079 – Oktober 2019 – versie 1

Dienst Neurologie

Ingang 12, route 1525
T +32 (0)9 332 45 29
neurologie@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



INFO VOOR PATIËNTEN



AZATHIOPRINE

(IMURAN®)



AZATHIOPRINE (IMURAN®)

Uw neuroloog heeft u azathioprine voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft algemene informatie over azathioprine en vervangt de bijsluiter niet.

Wat is azathioprine?

Azathioprine is een geneesmiddel in de vorm van tabletten van 25, 50 of 100 mg. Azathioprine wordt voorgeschreven bij de behandeling van auto-immune (neurologische) aandoeningen. Het geneesmiddel brengt het ontstekingsproces in het zenuwstelsel tot rust. Het kan twee tot vier maanden duren voor u merkt dat het medicijn begint te werken.

Indien azathioprine een gunstig effect heeft, kunt u het jarenlang blijven gebruiken. Het is daarom belangrijk dat u het middel blijft innemen zoals de arts het voorschrijft, tenzij u bijwerkingen ervaart of uw arts u anders adviseert.

Combinatie met andere geneesmiddelen

U kunt azathioprine gebruiken in combinatie met bijna alle geneesmiddelen. Enkele geneesmiddelen beïnvloeden echter de werking van azathioprine. Gebruik het bijvoorbeeld niet samen met allopurinol (Zyloric®, voor jicht). Vertel uw huisarts en specialist altijd welke geneesmiddelen u inneemt en vraag advies bij nieuwe medicatie.

Hoe innemen?

Neem de tabletten tijdens de maaltijd in, elke dag ongeveer op hetzelfde tijdstip. Slik ze in hun geheel door. Breek ze niet, of kauw er niet op. Als u in de loop van de dag ontdekt dat u de tabletten bent vergeten in te nemen, neem ze dan

nog dezelfde dag in. Hoeveel tabletten u moet innemen, hangt af van uw lichaamsgewicht. Spreek dus met uw specialist als u sterk bent aangekomen of afgevallen.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van azathioprine die ooit zijn gemeld.

De meest voorkomende zijn:

- ▲ Maag- en darmklachten, zoals een verminderde eetlust, een vol gevoel, misselijkheid en braken of diarree
- ▲ Huiduitslag
- ▲ Overgevoeligheidsreacties, zoals koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van de huid of ogen (geelzucht)
- ▲ Erge keelpijn in combinatie met koorts, bloedneuzen en blauwe plekken (allemaal tekenen van een stoornis in de bloedaanmaak)

In sommige gevallen:

- ▲ Stoornissen in de werking van de lever. U merkt daar niets van, maar het kan wel aangetoond worden bij een bloedonderzoek.
- ▲ Ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis).
- ▲ Haarverlies (tijdelijk, spontaan herstellend).
- ▲ Hoge cholesterolwaarden.
- ▲ Mogelijk veroorzaakt azathioprine een licht verhoogd risico op huidkanker. Bescherm u goed tegen de zon en neem contact met uw huisarts/dermatoloog bij veranderende, verkleurende of onregelmatige huidletsels.

Neem onmiddellijk contact op met uw specialist of huisarts:

- ▲ Erge keelpijn in combinatie met koorts
- ▲ Herhaaldelijke bloedneuzen
- ▲ Snel blauwe plekken krijgen

- ▲ Koorts, koude rillingen, spierpijn of een gele verkleuring van uw huid of ogen
- ▲ Hevige buikpijn

Hebt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw neuroloog.

Controles

Om eventuele stoornissen in de werking van de lever of de aanmaak van het bloed in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist regelmatig uw bloed onderzoeken:

- ▲ in het begin wekelijks gedurende 4 weken
- ▲ daarna tweewekelijks gedurende 8 weken
- ▲ dan maandelijks gedurende 4 maanden
- ▲ driemaandelijks, bij minstens 3 maanden stabiele dosis

Die bloedafnames kunnen bij de huisarts gebeuren. U contacteert de huisarts de dag erna voor het resultaat. Vraag om een kopie te sturen naar uw behandelend neuroloog.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

De risico's van een behandeling met azathioprine tijdens de zwangerschap zijn onduidelijk. Overleg steeds een eventuele zwangerschapsplanning met uw neuroloog. Vermijd borstvoeding wanneer u azathioprine inneemt.

Vaccinaties

U kunt niet alle vaccinaties krijgen tijdens het gebruik van deze medicatie. Overleg altijd met uw specialist als u een vaccinatie nodig hebt. De grieprik is veilig en wordt ook aangeraden door uw specialist.