

UW BEHANDELING MET TAXOTERE

**KANKERCENTRUM
UZ GENT**



INHOUDSTAFEL

| | | |
|----|--|---|
| 01 | Inleiding | 3 |
| 02 | Vorbereiding van de behandeling | 4 |
| 03 | Schematische voorstelling van de behandeling | 4 |
| 04 | Notities | 5 |

01 INLEIDING

In samenspraak met uw arts werd beslist om chemotherapie te starten. De behandeling bestaat uit één cel remmend geneesmiddel (chemotherapeuticum): Taxotere®. Deze therapie wordt volledig via een perifere infuus of poortkatheter gegeven.

U krijgt ook medicatie om nevenwerkingen zoveel mogelijk te beperken.

De volledige behandeling loopt over 1 dag en wordt om de 21 dagen herhaald, op voorwaarde dat uw bloedcontrole goed is en dat uw algemene toestand dit toelaat. Deze periode van 21 dagen noemen we één kuur of cyclus.

Deze behandeling wordt georganiseerd in het dagziekenhuis. U hoeft dus niet in het ziekenhuis te overnachten. De behandeling gebeurt steeds in de namiddag vanaf 13u30.

Wekelijks komt u langs op de polikliniek thoracale oncologie voor een bloedafname. Daarna wordt u gezien door een arts of door de verpleegkundig consulent thoracale oncologie.

De arts zal het aantal toedieningen met u bespreken. Om de twee kuren wordt het effect van de chemotherapie beoordeeld door een controle met (PET)CT-scan. De arts bespreekt de resultaten van dit onderzoek tijdens de consultatie.

Mogelijke nevenwerkingen van de therapie zijn:

- Tijdelijke onderdrukking van het beenmerg met verminderde bloedaanmaak
- Vermoeidheid
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Constipatie
- Haarverlies
- Nagelveranderingen
- Allergische reacties

Minder frequente nevenwerkingen zijn:

- Smaakveranderingen
- Huidreacties
- Tintelingen in handen en voeten (neurotoxiciteit)
- Ontsteking van het mondslijmvlies
- Hand-voet syndroom

De arts en/of verpleegkundige zal met u deze nevenwerkingen bespreken. We verwijzen u naar de specifieke brochure voor verdere uitleg over de nevenwerkingen. Het is zeer belangrijk de arts of verpleegkundige tijdig op de hoogte te brengen van mogelijke bijwerkingen.

Soms kan in de loop van de behandeling een dosisaanpassing van de therapie of uitstel nodig zijn omdat uw bloed traag herstelt of omwille van nevenwerkingen. Het is immers belangrijk om te trachten de behandeling op correcte tijdstippen te geven.

02 VOORBEREIDING VAN DE BEHANDELING

Dexamethasone®

De dag vóór, de dag van (=dag 1) en de dag na de kuur moet u Dexamethasone® nemen (2 keer per dag 4mg). Dit is van belang om allergische reacties op Taxotere® te voorkomen. Meld het aan de arts of de verpleegkundige als u deze medicatie niet genomen hebt.

03 SCHEMATISCHE VOORSTELLING VAN DE BEHANDELING

| | Generieke naam | Merksnaam | Dag toediening | | | | | Wijze van toediening |
|--|----------------|--------------------|----------------|---|---|------|----|--------------------------------|
| | | | 0 | 1 | 2 | 3-20 | 21 | |
| | Dexamethasone | Dexamethasone 4 mg | X | X | X | | X | Comprimé met water in te nemen |
| | Docetaxel | Taxotere® | | X | | | | Infuus over 1 uur |

Tussen de verschillende producten wordt gespoeld met het basisinfuus. We vragen om uw arm niet te plooiën tijdens de inloop van de chemotherapie. Aarzel niet om elke abnormale gewaarwording aan de verpleegkundige te melden.

De toedieningstijd is niet gelijklopend aan het verblijf op het dagziekenhuis. De chemotherapeutica worden aangeleverd via de dienst apotheek. Hierdoor kunnen wachttijden ontstaan.

Succes met de behandeling!

04 NOTITIES

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

➤ -----

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.