

# UW BEHANDELING MET GLIVEC

-

## ENKELE BELANGRIJKE RAADGEVINGEN

---

KANKERCENTRUM



---

---

## INHOUDSTAFEL

01	Inleiding	3
02	Werking van Glivec®	3
03	Verloop van de behandeling	3
04	Adviezen bij de inname van Glivec	4
05	Bijwerkingen	5
06	Geneesmiddelen, dranken en plantaardige bereidingen die niet mogen gecombineerd worden met Glivec®	16

## 01 INLEIDING

In deze brochure geven we u enkele handige tips om bijwerkingen te vermijden of te behandelen en vermelden we wanneer u best de arts, de verpleegkundige (consulent) of de apotheker contacteert. Zij geven u graag meer uitleg, dus aarzel niet om hen te contacteren.

De **groene tekst** zijn tips die u kunnen helpen bij het omgaan met de klacht.

De **rode tekst** geeft u meer uitleg over wat u best niet doet bij een bepaalde klacht.

Hebt u nog vragen over een bepaalde klacht, noteer ze. In een volgende consultatie zullen we deze samen bespreken.

Om geen dubbele spaties te krijgen in de inhoudstafel is het belangrijk om bij het eerste titelniveau **vóór** een handmatig **regeleinde** (*shift return*) in de titel **géén spatie** te zetten. Het handmatig regeleinde wordt door Word immers vertaald in een spatie in de inhoudsopgave.

## 02 WERKING VAN GLIVEC®

De werkzame stof van Glivec® is imatinibmesilaat.

Imatinib remt de groei van kankercellen door zich vast te hechten aan bepaalde eiwitten in abnormale cellen.

## 03 VERLOOP VAN DE BEHANDELING

De duur van de behandeling wordt vastgelegd in samenspraak met uw arts. De behandeling duurt zolang uw arts ze doeltreffend vindt en de bijwerkingen dragelijk zijn.

## 04 ADVIEZEN BIJ DE INNAME VAN GLIVEC

### Hoe moet ik het geneesmiddel innemen?

- Glivec® moet u **1 x per dag** innemen met een beetje water.
  - → **1 tablet van 400 mg per dag**
- Neem dit telkens op ongeveer hetzelfde tijdstip.
- Neem dit steeds met of steeds zonder voedsel.
- Kauw niet op de tablet en plet ze bij voorkeur niet.
- Neem de medicatie niet vast met blote handen. Breng de medicatie rechtstreeks vanuit de verpakking in de mond.
- Was steeds uw handen na het innemen van uw medicatie.
- Kan u de tabletten echt niet inslikken, plet deze dan voorzichtig en los deze vervolgens op in een glas water. Ga als volgt te werk:
  - Doe de geplette tabletten in een groot glas water.
  - Was nadien uw handen.
  - Roer met een lepel tot alles opgelost is.
  - Drink het volledige glas onmiddellijk leeg.
  - Let op dat het glas door niemand anders gebruikt wordt en was het glas onmiddellijk af.

### De dosering van Glivec®

De meest gebruikelijke dosering van Glivec® is 400 mg. Uw arts kan beslissen om de behandeling aan een lagere dosis op te starten of de dosering van uw behandeling tijdelijk of definitief te verminderen. Dit gebeurt wanneer de arts merkt dat u het geneesmiddel minder goed verdraagt. Daarom is dit geneesmiddel ook beschikbaar in capsules van 100 mg.



Verminder de dosering nooit op eigen houtje! Neem steeds de dosering die uw arts heeft voorgeschreven.

### Wat moet ik doen als ik een inname vergeten ben?

Als u een dosis hebt gemist, neem de volgende dosis dan in volgens het schema.



Neem geen dubbele dosis om de vergeten tabletten in te halen.

## Wat moet ik doen als ik te veel tabletten heb ingenomen?

Als u per vergissing teveel Glivec® hebt ingenomen, neem dan steeds contact op met uw huisarts of uw behandelende arts van het ziekenhuis.

## Wat moet ik doen indien ik moet braken?

Als u moet braken na het innemen van een tablet Glivec®, neem dan géén nieuwe tablet. Enkel als u in het braaksel een volledige tablet ziet, mag u een nieuwe tablet innemen.

## Hoe moet ik de medicatie bewaren?

- Houd de doos en de tabletten buiten het bereik van kinderen.
- Laat de tabletten in hun verpakking tot u ze inneemt, dit om ze te beschermen tegen het licht en vochtigheid.
- Bewaar Glivec® op kamertemperatuur.
- Gebruik Glivec® niet meer na de uiterste houdbaarheidsdatum. Deze datum staat op het doosje bij "EXP".
- Gooi resterende tabletten nooit in de vuilnisbak maar geef ze af aan uw apotheker in het ziekenhuis.

## Belang van een juiste inname van uw medicatie

Het is belangrijk om Glivec® dagelijks in te nemen. Zo werkt het geneesmiddel voortdurend tegen de kankercellen met een optimale doeltreffendheid en slaagkans tot gevolg.

Als u Glivec® slechts af en toe zou innemen, krijgen de kwaadaardige cellen meer kans om opnieuw te groeien.

U zal wel eens een moment hebben waarop u denkt te willen stoppen met de behandeling, zeker wanneer de bijwerkingen de kop opsteken. Maar het is net heel erg belangrijk dat u volhoudt en de behandeling voortzet.

Aarzel niet om contact op te nemen met uw arts, de oncologisch verpleegkundige of de ziekenhuisapotheker als u bijwerkingen ervaart.

## 05 BIJWERKINGEN

Het is mogelijk dat er tijdens de behandeling bijwerkingen optreden. De intensiteit van deze bijwerkingen verschilt van persoon tot persoon.

Het is steeds belangrijk om uw arts, de verpleegkundige of de apotheker op de hoogte te brengen als u bepaalde bijwerkingen ervaart. Ze zullen u adviezen geven om de klachten te verminderen of te behandelen.

Wees niet ongerust als u weinig bijwerkingen ervaart. Dit betekent zeker niet dat de therapie onvoldoende of niet werkt.

### **Volgende bijwerking kan u ervaren (Kop\_Kader)**

■ Vermoeidheid	6
■ Misselijkheid en braken	8
■ Diarree	10
■ Veranderingen ter hoogte van de huid	11
■ Vermindering van het aantal rode en/of witte bloedcellen	12
■ Ooglast	14
■ Griepig gevoel	15
■ Invloed op seksualiteit	16

In de **informatiegids** vindt u een **dagboek** waarin u uw klachten kan noteren. Het dagboek kan u helpen om uw klachten in kaart te brengen als we ze samen bespreken. Breng dus zeker uw gids mee naar de consultaties.

De verpleegkundig consulent zal u tijdens uw behandeling op vaste tijdstippen telefonisch contacteren om te horen hoe u de behandeling ervaart. Zo kunnen we steeds tijdig zoeken naar een goede oplossing bij uw klachten.

## **Vermoeidheid**

Dit is een zeer vaak voorkomende bijwerking. Vermoeidheid wordt gekenmerkt door:

- u algemeen zwak voelen
- zware ledematen
- verminderde aandacht en concentratie
- niet goed slapen, een toegenomen slaapbehoefte
- geïrriteerd zijn
- belemmering bij het uitvoeren van de dagelijkse activiteiten
- zware vermoeidheid na een inspanning
- u niet goed voelen in uw vel

Deze vermoeidheid kan een sterke impact hebben op uw dagelijkse activiteiten. Met deze tips kan u toch de mogelijke ongemakken beperken.

## Mag ik sporten?

Sporten is ideaal voor de gezondheid. Dus ook tijdens uw behandeling is bewegen belangrijk. Enkel indien u zich echt ziek of uitgeput voelt, mag u zich niet forceren. Maar probeer te bewegen en dit hoeft niet altijd intensief te zijn. Wandelen of fietsen bijvoorbeeld. De (klein)kinderen afhalen van school, boodschappen te voet doen, de auto wat verder parkeren en het laatste eindje wandelen, de trap nemen in plaats van de lift, ... Dit kan allemaal helpen om uw uithouding en kracht op peil te houden.

### TIPS

- **Probeer uw normaal levenspatroon zoveel mogelijk te behouden.**
- **Plan uw activiteiten en voer ze op uw eigen tempo uit. Geef voorrang aan de activiteiten die werkelijk nodig zijn die dag en die u graag doet.**
- **Kies ervoor om te doen wat u moet en wil doen en pas zo nodig uw activiteiten aan.**
- **Las indien nodig korte rustpauzes in.**
- **Slaap overdag niet te lang, rust regelmatig een half uurtje.**
- **Vraag hulp aan anderen wanneer nodig.**
- **Zorg voor een evenwichtige voeding en drink voldoende.**
- **Maak korte wandelingen en doe lichte activiteiten, dit kan deugd doen.**
- **Maak voldoende tijd vrij voor ontspanning.**
- **Zorg voor een goede nachtrust.**
- **Als u de slaap niet kan vatten, blijf dan niet in bed liggen. Sta op en ga iets drinken of doe kort iets ontspannend.**
- **Als u moeilijk blijft slapen, bespreek dit dan zeker met de arts en de verpleegkundige. Zij zullen u verder kunnen helpen.**

### LET OP

- **Als u zich ongewoon vermoeid voelt, wees dan voorzichtig wanneer u met de auto rijdt of machines bedient.**
- **Vermijd onnodige activiteiten, stress of spanningssituaties.**
- **Vermijd overmatig alcoholgebruik.**
- **Vermijd slapen overdag (zodat u voldoende moe bent voor het slapengaan).**

- **Vermijd stimulerende middelen (zoals cafeïnerijke dranken) voor het slapengaan.**

!

#### **Wanneer moet ik contact opnemen met het ziekenhuis?**

- In bepaalde gevallen van ernstige vermoeidheid, zoals bv. in geval van kortademigheid bij een lichte inspanning.

In het UZ Gent wordt een vijftal keer per jaar vermoeidheidsessies georganiseerd voor patiënten en hun familie. Individueel kan u ook terecht bij de verpleegkundig consulent en de psychologen om u hierin verder te begeleiden.

U kan Mindfulness volgen. Ook deze vorm van therapie heeft reeds zijn nut aangetoond bij de aanpak van deze bijwerking. Voor meer informatie hierover kan u terecht bij de Ingrid Jacobs, psychologe (ingrid.jacobs@uzgent.be of 09/332.54.08)

## **Misselijkheid en braken**

Misselijkheid is een vaak voorkomende bijwerking. De intensiteit verschilt van persoon tot persoon. Deze misselijkheid kan leiden tot braakneigingen en braken.

Bij de meeste patiënten gaat het om een zwakke tot matige vorm van deze bijwerking. U kan last hebben van:

- minder eetlust
- een zwaar gevoel in de maag
- een opgeblazen gevoel
- een pijnlijke maag
- braakneigingen

De misselijkheid treedt meestal kort op en vooral in de beginfase van de behandeling. Volg onderstaande voedingsregels als u last hebt van deze bijwerking.



## TIPS

- Eet kleine hoeveelheden, gespreid over de dag. Vermijd zware maaltijden.
- Eet voedsel dat u lekker vindt.
- Eet droog voedsel zoals granen en toast.
- Drink regelmatig water, maar drink kleine hoeveelheden zodat u geen opgeblazen gevoel hebt.
- Zorg ervoor dat u frisse lucht hebt.
- Spoel na het braken uw mond met koud water en wacht 1 tot 2 uur alvorens te eten.
- Als u misselijk bent, geef dan de voorkeur aan koude of lauwe voedingsmiddelen. Deze geven minder geur af dan warm voedsel.
- Vraag uw (huis)arts een geneesmiddel tegen misselijkheid of braken. Neem het anti-braakgeneesmiddel in 30 minuten voor de maaltijd of zoals voorgeschreven door uw arts.



## LET OP

- Vermijd sterke kruiden, te zoet, gebraden of vet voedsel (bv. gefrituurd voedsel).
- Vermijd drinken tijdens de maaltijd, dit neemt uw eetlust weg.
- Vermijd onmiddellijk te gaan liggen na de maaltijd, een halfzittende houding is beter.
- Als u misselijk bent, vermijd dan sterke geuren. Deze kunnen de misselijkheid verergeren.
- Vermijd alcoholische dranken.
- Minderen of stoppen met roken is aangeraden.

### Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

Als de misselijkheid of het braken leidt tot:

- ! ■ Onvoldoende voedselopname met ernstig gewichtsverlies tot gevolg.
- Uitdroging (dorst, droge huid, droge lippen, weinig plassen).
- Zeer frequent braken (meer dan driemaal per dag).

## Diarree

De behandeling met Glivec® kan leiden tot diarree. Dit betekent dat u vaker stoelgang maakt en dat uw stoelgang waterig kan zijn. Deze bijwerking is doorgaans licht tot matig ernstig.

De behandeling met Glivec® kan leiden tot diarree. Dit betekent dat u vaker stoelgang maakt en dat uw stoelgang waterig kan zijn. Deze bijwerking is doorgaans licht tot matig ernstig.

### TIPS

- **Drink regelmatig water zodat u een voldoende vochtopname hebt (1,5 l).**
- **Bij grote vochtverliezen is meer vocht nodig (2 tot 2,5 l). Drink dan bijvoorbeeld sportdranken zodat u ook de nodige mineralen binnen hebt bv. Aquarius, AA drink.**
- **Kijk regelmatig na of uw urine niet te donker is. Dit kan een teken zijn van uitdroging.**
- **Eet vet- en vezelarme voeding zoals:**
  - pasta, wit brood of rijst
  - mager vlees (kalkoen, kip)
  - cornflakes
  - vis
  - geschild fruit
- **Stop tijdelijk het eten van vezelrijke voeding.**
- **Het slijmvlies van de sluitspier kan geïrriteerd zijn door de diarree. Gebruik zacht toiletpapier of een washandje. Zorg voor een goede lichaamshygiëne en breng een zinkzalf aan ter hoogte van de sluitspier om de huid te beschermen.**
- **Vraag aan uw (huis)arts een geneesmiddel tegen diarree.**



### LET OP

- **Vermijd voedingsmiddelen die de darmbeweging doen toenemen:**
  - grote en vetrijke maaltijden
  - alcohol (bier, wijn)
  - cafeïnehoudende dranken (koffie, thee, chocolade)
  - voeding met grove vezels, zaden of pitten (volkorenbrood)
  - schillen van fruit, noten

- **Vermijd voedingsmiddelen die de gasvorming verhogen:**
  - **ui, prei, kool, knoflook, paprika, komkommer, meloen**
  - **koolzuurhoudende dranken**
- **Vermijd voedingsmiddelen die de darmslijmvliezen irriteren: sterke kruiden en specerijen.**
- **Vermijd producten die sorbitol bevatten (snoepgoed & kauwgom).**
- **Vermijd het drinken van water tijdens en tot 1 uur na de maaltijd.**
- **Vermijd melk en zuivelproducten (melk, yoghurt, ijs, kaas, room).**

---

#### **Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?**

!

- Als de diarree gepaard gaat met koorts, ernstige krampen of braakneigingen.
- Als u last hebt van uitdrogingsverschijnselen: een droge mond, een droge tong, droge lippen, een droge en verrimpelde huid en donkere urine.
- Als u last hebt van een bloederige stoelgang.

## **Veranderingen ter hoogte van de huid**

De behandeling met Glivec® kan bijwerkingen hebben ter hoogte van de huid. Die veranderingen zijn:

- een droge / schilferige huid
- ontstaan van huidkloven
- huiduitslag

---

!

Belangrijk: Glivec® veroorzaakt geen haaruitval!

### **TIPS**

- **Gebruik regelmatig een verzachtende en vochtinbrengende crème, vooral op droge zones.**
  - **Gebruik een neutrale vochtinbrengende crème, geen geparfumeerde crèmes.**
  - **Neem liever een douche in plaats van een bad. In bad zal uw huid te veel verweken.**
  - **Gebruik bij het douchen best een neutrale en ongeparfumeerde douchegel.**
-

- **Gebruik een hoge beschermingsfactor (bv. factor 50) bij blootstelling aan de zon.**
- **Draag best loszittende, katoenen kledij. Zorg voor een goede verluchting van de huid.**
- **Gebruik colloïdale gels of verband van het type “tweede huid” om wrijvingen in schoenen te vermijden (bv. Compeed®).**
- **Als u last hebt van jeuk, vraag dan een jeukstillend geneesmiddel aan uw arts of apotheker.**

---

### LET OP

- **Vermijd directe blootstelling aan de zon.**
- **Vermijd te warme of te veelvuldige douches.**



### Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Als de huiduitslag en/of de jeuk hinderlijk wordt.

## Vermindering van het aantal rode en/of witte bloedcellen

Door deze behandeling kunnen deze bloedcellen in aantal verminderen.

### Rode bloedcellen

Rode bloedcellen zijn in ons lichaam belangrijk om zuurstof te vervoeren. Bij een verminderd aantal rode bloedcellen kan bloedarmoede optreden. Hierdoor kan u volgende symptomen hebben:

- vermoeid zijn
- snel futloos zijn
- algemeen gevoel van zwakte
- bleke huid en lippen
- duizeligheid

### TIPS

- **Plan uw activiteiten op een dag. Wissel de activiteiten tijdig af met een korte rustpauze.**
- **Vraag aan anderen om ook een handje te helpen.**

- **Zorg voor een goede voeding met voldoende ijzer (runds- en lamsvlees, donkergroene bladgroenten, broccoli, bonen) en vitamine B (melk, eieren, kaas, vlees), vitamine C (paprika, kiwi) en foliumzuur (spinazie, broccoli, bonen, volkorenbrood).**
- **Drink voldoende.**

---

### ! Wanneer neemt u contact op het met het ziekenhuis?

- Als u zich duizelig voelt of kortademig bent.
- Als u zich bij de minste inspanning heel moe voelt.

## Witte bloedcellen

Bij een verminderd aantal witte bloedcellen verhoogt de kans op infectie. Deze infectie wordt best zo snel mogelijk bestreden aangezien er minder witte bloedcellen zijn die uw lichaam verdedigen. Vroegtijdige behandeling is dus de boodschap.

Tekenen van infectie kunnen zijn:

- koorts, zweten, koude rillingen
- keelpijn, hoest, verstopte neus
- hoofdpijn
- branderig gevoel bij het plassen
- ziektegevoel, uitputting
- roodheid, zwelling, ettervorming (lokale infectie)



### TIPS

- **Meet regelmatig uw lichaamstemperatuur. Liefst steeds op hetzelfde tijdstip, bv. 's avonds.**
- **Bij 38°C of meer, steeds het ziekenhuis verwittigen!**
- **Zorg voor een goede lichaamshygiëne. Was regelmatig uw handen.**
- **Pas een goede mondzorg toe en controleer uw mond op roodheid of aften.**
- **Voorkom wondjes en verzorg opgelopen wondjes meteen.**
- **Vermijd contact met mensen die griep hebben of verkouden zijn.**

- Vermijd druk bevolkte plaatsen, zoals winkels, bioscoop, zwembaden, sportmanifestaties, markt, ...
- Laat anderen tijdelijk uw huisdieren verzorgen.

---

#### Wanneer neemt u contact op met het ziekenhuis?

- Als u tekenen van infectie waarneemt of koorts hebt
- Vanaf 38°C STEEDS contact opnemen met uw behandelende arts, de verpleegkundig consulent of de verpleegkundige van dagkliniek/hospitalisatieafdeling. Neem nooit op eigen initiatief geneesmiddelen in als u vermoedt dat u een infectie hebt.

## Ooglast

De behandeling met Glivec® kan pijnlijke ogen veroorzaken. Dit kan het gevoel geven van zand in de ogen te hebben. De oogranden kunnen rood of ontstoken zijn.

's Morgens kunnen er korstjes in de ogen zitten.

U kan ook last krijgen van tranende ogen. Dit ontstaat als gevolg van oogirritatie. Daarbij kunnen oogdruppels verzachting brengen.

### TIPS

- **Pijnlijke ogen**
  - Laat de ogen zoveel mogelijk rusten.
  - Bescherm de ogen tegen scherp licht met een zonnebril (ook eventueel thuis).
  - Rust met gesloten ogen.
  - Gebruik indien nodig oogdruppels of oogzalf.
- **Korstvorming in de ogen**
  - Week de korstjes los met lauw water.
  - Verwijder de korstjes met een compres. Gebruik één compresje per oog.
  - Wanneer u make up gebruikt, wees matig en zorg voor een grondige oogreiniging alvorens u gaat slapen.
- **Tranende ogen**
  - Hierbij kunnen oogdruppels werken.

## LET OP

- Vermijd te sterke lichtschommelingen.
- Vermijd veelvuldige make-up.

### ! Wanneer neemt u contact op het met het ziekenhuis?

- Als u enkele dagen veel korstjes opmerkt en deze een donkergele of groene kleur hebben.
- Bij wazig zicht, gekleurde vlekken of sterretjes zien.
- Bij aanhoudende pijn.
- Bij overvloedig tranende ogen.

## Griepig gevoel

Door de behandeling met Glivec® kan u last hebben van een griepig gevoel. Deze klachten kunnen bestaan uit:

- hoofdpijn
- spierpijn
- koude rillingen
- koorts

## TIPS

- **Neem voldoende rust en drink voldoende.**
- **Hebt u last van koude rillingen of algemeen minder goed voelen, bedenk dan om eens de temperatuur te meten. Is deze rond de 38°C dan kan dit wijzen op een bijkomende infectie**
- **Neem strikt de voorgeschreven medicatie.**

### ! Wanneer neemt u contact op het met het ziekenhuis?

- Als de tekenen van infectie niet verdwijnen ondanks het innemen van de voorgeschreven medicatie.

## Invloed op seksualiteit

De invloed van een behandeling op de seksualiteit is voor iedere patiënt verschillend. Zowel de lichamelijke als emotionele gevolgen van uw ziekte en uw behandeling kunnen gevolgen hebben voor uw seksuele behoefte en uw seksleven. Het is goed mogelijk dat u door andere zorgen uw seksleven nu minder belangrijk vindt. Misschien moeten u en uw partner nog wennen aan de nieuwe situatie. Het kan ook zijn dat u door de therapie een aantal lichamelijke klachten ondervindt zoals vermoeidheid en misselijkheid. Vrouwen kunnen last krijgen van vaginale droogte, de menstruatie kan voor langere of kortere periode stoppen. Ook daardoor kan de zin om te vrijen sterk verminderd zijn. Tijdens uw behandeling hebt u misschien meer behoefte aan begrip, warmte en intimiteit, maar dit is niet altijd gemakkelijk realiseerbaar.

Het bespreekbaar maken van seksuele problemen is belangrijk. Door erover te praten met uw partner leert u elkaar beter te begrijpen. Ook met uw zorgverleners kunt u problemen rond seksualiteit bespreken.

Tijdens uw behandeling is het belangrijk om voorbehoedsmiddelen te gebruiken. Een mogelijke zwangerschap moet nu immers voorkomen worden, omdat de therapie schadelijk kan zijn voor de baby. Is een zwangerschap niet mogelijk, dan nog is het raadzaam om een voorbehoedsmiddel te gebruiken. Restanten van het geneesmiddel kunnen ook in sperma of vaginaal vocht zitten. Daarom is het veiliger om met een condoom te vrijen. Bespreek het zeker met uw arts als u nog een kinderwens heeft.

## 06 GENEESMIDDELEN, DRANKEN EN PLANTAARDIGE BEREIDINGEN DIE NIET MOGEN GECOMBINEERD WORDEN MET GLIVEC®

Als u een geneesmiddel inneemt dat voorkomt in deze lijst, geef dit dan steeds door aan uw arts, huisarts of de ziekenhuisapotheker!

!

Het is belangrijk dat u steeds alle medicatie, alle voedingssupplementen of andere homeopathische middelen doorgeeft aan uw arts of apotheker.



## Geneesmiddelen

- **Antischimmelmiddelen:** Nizoral® (ketoconazole), Sporanox® (itraconazole)
- **Antiviralemiddelen:** Norvir® (ritonavir), Kaletra® (ritonavir, lopinavir), Atripla® (efavirenz), Stocrin® (efavirenz), Viramune® (nevirapine)...
- **Antibiotica:** Heliclar® (clarithromycine)
- **Anti-epileptica:** Tegretol® (carbamazepine), Diphantoïne®, Epanutin® (fenytoïne), Trileptal® (oxcarbamazepine), Topamax® (topiramaat), Gardenal® (fenobarbital)...
- **Geneesmiddelen voor hart en bloeddruk:** Isoptine®, Lodixal® (verapamil), Tildiem®, Progor® (diltiazem)...
- **Immunosuppressiva:** Neoral Sandimmun® (ciclosporine), Prograft®, Advagraf® (tacrolimus)...
- **Antitumormiddelen:** Tysabri® (natalizumab), Glivec® (imatinib), Nolvadex® (tamoxifen)...
- **Andere:** Dafalgan® (paracetamol)

## Dranken en kruiden

- **Pompelmoes** (in alle vormen: vers fruit, fruitsap)
- **Sint-Janskruid**

## Vragen? Noteer ze hier.

- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----
- -----