

INFO VOOR PATIËNTEN



BLAASINSTILLATIE

MET CHEMOTHERAPIE

INHOUD

01	Inleiding	4
02	Voor de start van de behandeling	5
03	Verloop van de blaasinstillatie	5
04	Na de blaasinstillatie	6
05	Bijwerkingen	7

01 INLEIDING

Bij een blaasinstillatie brengen we een geneesmiddel in de blaas. We doen dat via een sonde, een hol, soepel buisje.

Chemotherapeutica zijn celdodende geneesmiddelen of cytostatica. Bij een blaasinstillatie wordt de chemotherapie rechtstreeks in de blaas toegediend om de tumorcellen op de blaaswand te vernietigen. Deze vorm van chemotherapie komt niet in de bloedbaan terecht. U krijgt dus geen last van bijwerkingen zoals misselijkheid en haaruitval.

We dienen de behandeling met het chemotherapeuticum zes weken lang één keer per week toe. Nadien kunt u een onderhoudsbehandeling krijgen. Uw uroloog maakt een schema voor u op.

02 VOOR DE START VAN DE BEHANDELING

De dag dat u naar het ziekenhuis komt, belt u 's morgens vóór 9.30 uur naar de polikliniek Urologie om te bevestigen dat u op de afspraak zal zijn (tel. 09 332 22 76). We vragen dan aan de apotheker om het chemotherapeuticum alvast klaar te maken.

Als u koorts of tekenen van een blaasontsteking hebt gehad in de week voor de afspraak, moet u dat vermelden tijdens het telefoongesprek. Symptomen die kunnen wijzen op een blaasontsteking zijn:

- ▲ Frequent plassen
- ▲ Pijn of een branderig gevoel bij het plassen
- ▲ Moeilijk plassen
- ▲ Bloed in de urine

Om het product optimaal te laten werken, is het beter dat het niet te veel wordt verdund met urine. Daarom drinkt u beter niet te veel vanaf 6 uur vóór de toediening van de chemotherapie. Gebruikt u vochtafdrijvende medicatie (bvb. Lasix®, Burinex®)? Neem die dan pas in na het uitplassen van de medicatie.

03 VERLOOP VAN DE BLAASINSTILLATIE

- ▲ De verpleegkundige vraagt of u bijwerkingen had na de vorige instillatie.
- ▲ U trekt uw onderkledij uit en gaat op de behandeltafel liggen.
- ▲ De blaasinstillatie duurt ongeveer 10 minuten.
- ▲ De verpleegkundige schuift via de plasbuis een sonde in uw blaas en ledigt uw blaas voor de toediening van het product.
- ▲ Het chemotherapeuticum is een heldere vloeistof en zit in een spuit die op de sonde wordt geplaatst. Via de sonde dienen we dan het product toe.
- ▲ Na de toediening verwijdert de verpleegkundige de sonde.

Het inbrengen en verwijderen van de sonde is niet pijnlijk, maar kan wel onaangenaam aanvoelen. De toediening is niet pijnlijk, maar u kunt het wel voelen. Chemotherapie is niet onschadelijk. De verpleegkundige volgt daarom beschermingsmaatregelen bij de toediening van het product.

04 NA DE BLAASINSTILLATIE

Het chemotherapeuticum heeft één uur de tijd nodig om in de blaas in te werken. Het is mogelijk dat u sneller plasdrang krijgt door de inwerking van het product. Probeer het product één uur op te houden. Weet dat er op het ogenblik van de instillatie slechts 60 ml in uw blaas zit. Een normale plas is ongeveer 350 ml, dus uw blaas is zeker nog niet vol.

Nadat u het product één uur heb opgehouden, gaat u plassen. Contact met het chemotherapeuticum kan schadelijk zijn. Neem daarom volgende maatregelen tot 8 uur na de instillatie:

- ▲ Plas zittend op het toilet (ook mannen) om spatten te voorkomen. Uw urine is nu troebel.
- ▲ Spoel het toilet tweemaal door met een gesloten deksel.
- ▲ Was uw handen en schaamstreek met water en zeep om eventuele spatten van het product te verwijderen.
- ▲ Drink na het uitplassen van het product minstens 1 liter water. Zo worden de resten van het chemotherapeuticum zo snel mogelijk uit uw blaas gespoeld.
- ▲ Gebruik bij seksuele betrekkingen een condoom tot één week na de behandeling met chemotherapie. De mannelijke partner van een vrouw die vruchtbaar is, moet de hele behandelingsperiode een condoom gebruiken.

05 BIJWERKINGEN

Normale bijwerkingen

Het is niet vreemd dat u na de behandeling met het chemotherapeuticum plasklachten hebt zoals dringend plassen, frequent plassen, branderigheid bij het plassen en bloed in de urine. Deze klachten zijn normaal, maar mogen niet langer dan twee dagen duren.

Deze bijwerkingen verdwijnen meestal spontaan. Duren de klachten langer dan twee dagen, raadpleeg dan uw arts.

Alarmtekens

Plots niet meer kunnen plassen, is een alarmsignaal. De oorzaak is niet noodzakelijk de chemotherapie. Er kan ook een andere reden voor zijn.

Als u een uur na de toediening van het product niet kunt plassen, drink dan voldoende water. Kunt u na twee uur nog niet plassen, neem dan contact op met de dienst Urologie of het ziekenhuis. Vertel dat u een instillatie kreeg met een chemotherapeuticum.

Een andere, weinig voorkomende nevenwerking is een allergische reactie aan handen en genitaliën. Deze reactie kan 1 tot 2 dagen duren. Voordat u de volgende instillatie krijgt, brengt u uw arts en de verpleegkundige hiervan op de hoogte.

Polikliniek Urologie

Ingang 71, route 710

T +32 (0)9 332 22 76

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent

C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent

T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op

