

CRIZOTINIB (XALKORI®)

KANKERCENTRUM



INHOUDSOPGAVE

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	5
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	6
09	Waar verkrijgbaar?	6

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Xalkori® wordt gebruikt voor de behandeling van volwassen patiënten met een bepaalde vorm van longkanker, namelijk gevorderde niet-kleincellige longkanker (NSCLC). Xalkori® remt de groei en verspreiding van de kankercellen door zich vast te hechten aan een bepaalde stof in sommige kankercellen.

Xalkori® bevat de werkzame stof crizotinib.



02 INNAME

De gebruikelijke dosering is tweemaal per dag 1 capsule van 250 mg (de totale dagdosis is dus 500 mg). Slik de capsule in zijn geheel door met een half glas water. Neem de capsules in met ongeveer 12 uur ertussen, bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds. Kies voor vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis.

U kunt dit geneesmiddel met of zonder voedsel innemen. Bij misselijkheid kan het helpen de capsules met wat voedsel in te nemen.

De duur van de behandeling hangt af van hoe u de behandeling verdraagt en van het effect van de behandeling. Soms gebeurt het dat de nevenwerkingen hinderlijk zijn. In dat geval kan de arts met u bespreken om de dosis (tijdelijk) te verminderen of uw therapie even te onderbreken. Zo krijgt uw lichaam de kans om te herstellen.

03 PLETTEN / BREKEN

U mag de capsule niet openen, kauwen of pletten.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor u een behandeling met Xalkori® start, is het belangrijk om uw arts of apotheker te melden welke andere medicijnen u gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Xalkori® verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dit geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die u zonder voorschrift verkregen heeft.

Een medewerker van de ziekenhuisapothek belt u in de komende weken op om uw thuismedicatie te overlopen. Aan de hand van dit gesprek kijkt een apotheker na of alle medicatie die u neemt kan gecombineerd worden. Als er een optimalisatie mogelijk is, wordt dit met de behandelende arts besproken en indien relevant, wordt u op de hoogte gebracht.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMAATREGELEN

- Het is aangeraden dat mannen en vrouwen in de vruchtbare periode een betrouwbaar voorbehoedsmiddel gebruiken tijdens en tot minstens 90 dagen na de behandeling met Xalkori®.
- U moet extra voorzichtig zijn als u auto rijdt en machines gebruikt, omdat patiënten die Xalkori® gebruiken last kunnen krijgen van stoornissen in het gezichtsvermogen, duizeligheid en vermoeidheid.
- Eet geen pomelmoes, drink geen pomelmoessap of gebruik geen preparaten op basis van Sint-Janskruid. Deze producten kunnen de werking van Xalkori® nadelig beïnvloeden.
- Vermijd blootstelling aan zon en UV-licht zonder bescherming. Het is raadzaam beschermende kleding en zonnebrandcrème te gebruiken wanneer u wordt blootgesteld aan de zon.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

U gebruikt dit geneesmiddel 2 keer per dag:

- duurt het nog meer dan 6 uur voor u de volgende dosis normaalgezien inneemt? Neem de vergeten dosis dan toch nog in. Neem de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.
- duurt het nog minder dan 6 uur? Sla de gemiste dosis dan over. Vertel dit aan uw verpleegkundige of arts bij uw volgende bezoek.

Slik geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen.

Als u moet braken nadat u een dosis Xalkori® heeft ingenomen, neem dan geen extra dosis in maar neem uw volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip in.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- Diarree, obstipatie, opgeblazen gevoel
- Misselijkheid, braken, verminderde eetlust
- Gezichtsstoornissen (vb. lichtflitsen zien, dubbel zien, wazig zien)
- Vochttopstapeling (vb. dikke enkels of voeten)
- Verhoogd risico op infecties
- Hartritmestoornissen
- Vermoeidheid, duizeligheid
- Huiduitslag, gevoeligheid aan zon en UV-licht
- Tintelend gevoel in gewrichten of ledematen

Telefoonnummer verpleegkundig consulent: +32 9 332 07 99

08 BEWARING

Xalkori® moet bewaard worden op kamertemperatuur op een veilige plaats en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de ziekenhuisapotheek van het UZ Gent (ingang 12, route 1570). Breng uw identiteitskaart mee als u het geneesmiddel komt afhalen.

Xalkori® wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren ziekenhuisapotheek UZ Gent:

Maandag-vrijdag:	8u-20u
Zaterdag:	8u-12u en 13u-16u30
Zondag en feestdagen:	8u-13u

Telefoonnummer ziekenhuisapotheek: +32 9 332 32 41

Notities

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Kankercentrum UZ Gent. Het UZ Gent kan op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gesteld bij gebruik van deze brochure/dit protocol buiten het UZ Gent.