

UW BEHANDELING MET DECITABINE

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE

01	Uw behandeling	3
02	Vorbereiding en verloop van de behandeling	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Onderzoeken	6
05	Medicatie	6
06	Bijwerkingen	7

01 UW BEHANDELING

Decitabine (Dacogen®) heeft een toxische werking op abnormale cellen. Het dringt door tot in de kern van deze cellen en wordt in de cel omgezet tot een actieve component. Vervolgens wordt de actieve component ingebouwd in het DNA. Dit leidt tot onderdrukking van tumorale cellen en een verbeterde uitrijping van de normale beenmergcellen.

	Generische naam	Vb. specialiteitsnaam
	Decitabine	Dacogen®

02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Deze behandeling wordt op het dagziekenhuis (ingang 12, route 1323) toegediend. In uitzonderlijke gevallen kan uw arts beslissen om uw behandeling te geven tijdens een opname op de hospitalisatieafdeling (ingang 12, route 1467 of 1416).

Bij een opname op het dagziekenhuis komt u steeds terecht op een 2-persoonskamer. U hoeft vooraf niet nuchter te zijn, een lichte maaltijd die dag kan zelfs aangewezen zijn om misselijkheid te voorkomen. Voor de start van elke kuur, op dag 1, wordt een bloedafname uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten kan de therapie opgestart, maar ook uitgesteld worden naar een later moment (dit in overleg met uw arts). Deze bloedafname zal tijdens uw kuur enkele keren worden herhaald, om na te kijken of u al dan niet transfusie nodig heeft.

Decitabine wordt toegediend via een intraveneus infuus, het loopt gedurende 1 uur, en dit gedurende 5 of 10 opeenvolgende dagen. Eén cyclus van Decitabine duurt 28 dagen.

Er zijn 2 mogelijke behandelingschema's; uw arts zal steeds beslissen welke voor u het beste schema is. De beide mogelijkheden worden hieronder schematisch weergegeven.

Tijdens uw rustperiode wordt GEEN Decitabine toegediend, maar zal u wel af en toe voor een bloedcontrole naar het dagziekenhuis moeten komen.

03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

Behandeloptie 1

	Product	Toediening	Tijdsduur	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4	DAG 5	DAG 6	DAG 7
WEEK 1	Decitabine	IV ¹	Loopt over 1 uur	X	X	X	X	X		
	DAG 8	DAG 9	DAG 10	DAG 11	DAG 12	DAG 13	DAG 14			
WEEK 2	RUSTPERIODE									
	DAG 15	DAG 16	DAG 17	DAG 18	DAG 19	DAG 20	DAG 21			
WEEK 3	RUSTPERIODE									
	DAG 22	DAG 23	DAG 24	DAG 25	DAG 26	DAG 27	DAG 28			
WEEK 4	RUSTPERIODE									

¹ INTRAVENEUS (IN EEN ADER)

Behandeloptie 2

	Product	Toediening	Tijdsduur	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4	DAG 5	DAG 6	DAG 7
WEEK 1	Decitabine	IV	Loopt over 1 uur	X	X	X	X	X	X	X

	Product	Toediening	Tijdsduur	DAG 8	DAG 9	DAG 10	DAG 11	DAG 12	DAG 13	DAG 14
WEEK 2	Decitabine	IV	Loopt over 1 uur	X	X	X				

	DAG 15	DAG 16	DAG 17	DAG 18	DAG 19	DAG 20	DAG 21
WEEK 3	RUSTPERIODE						

	DAG 22	DAG 23	DAG 24	DAG 25	DAG 26	DAG 27	DAG 28
WEEK 4	RUSTPERIODE						

04 ONDERZOEKEN

De arts bepaalt wanneer er een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden. Meestal vindt dit plaats na 4 cycli. Enkele frequent voorkomende onderzoeken zijn:

- Een bloedonderzoek
- Een beenmergonderzoek (bij evaluatie van effect therapie)

05 MEDICATIE



Informeer steeds uw behandelende arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt! **(zowel de geneesmiddelen die worden voorgeschreven, als de (genees)middelen die u zonder voorschrift gebruikt (bv. kruidenpreparaten of vitamines)**

06 BIJWERKINGEN

Volgende bijwerkingen kunt u ervaren

- Beenmergonderdrukking: de bloedvormende functie kan mogelijks in het gedrang komen. Hierdoor kan het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes fors dalen. Dit kan bloedarmoede tot gevolg hebben, maar ook een verhoogde gevoeligheid voor infecties en een verhoogde bloedingsneiging.
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Hoofdpijn
- Ontstekingen in de mond

!

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is zeer individueel en persoonlijk! Iedereen reageert anders op de toediening.

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen hebben er minder last van. Belangrijk hierbij is dat de ernst van de bijwerkingen niets te maken heeft met het resultaat van de behandeling!

Het is belangrijk dat u steeds uw bijwerkingen vermeldt aan uw arts of verpleegkundige bij een volgend ziekenhuisbezoek. Op die manier kunnen er mogelijkheden gezocht worden om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.