

Zorg ervoor dat er de eerste dagen na de ingreep geen water in het oor van uw kindje loopt. Nadien moet u geen speciale richtlijnen meer volgen bij het in bad gaan. Ook zwemmen kan, tenzij uw arts daar anders over denkt.

We voorzien gewoonlijk na drie à vier weken een controleafspraak op de polikliniek.

Mogelijke complicaties

In een klein percentage van de gevallen treedt een van de volgende complicaties op:

- ▲ Blijvend gaatje in het trommelvlies na uitstoten van het buisje (2%).
- ▲ Reactie op het vreemde lichaam of ontsteking.
- ▲ Een loopoor als gevolg van blijvende middenoorontstekingen.
- ▲ Verkalking van het trommelvlies.

Opmerking

We hebben een operatiedatum met u afgesproken. Gelieve er rekening mee te houden dat verschuivingen om organisatorische of medische redenen altijd mogelijk zijn. Als u om welke reden dan ook de operatie wil annuleren of verplaatsen, verwittig ons dan ruim op voorhand zodat geen kostbare operatietijd verloren gaat.

Hebt u nog vragen, stel ze dan gerust aan de behandelende arts.

v.u.: Eric Morlier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Mirto Print – 118261 – December 2019 – versie 5

Dienst Neus-, keel- en oorheelkunde

Ingang 69, route 690
 T +32 (0)9 332 23 32 of +32 (0)9 332 26 21
 F +32 (0)9 332 49 93
 nko@uzgent.be
 www.uzgent.be/neuskeeloor

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
 C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
 T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



DIABOLO'S

TROMMELVLIESBUISJES



TROMMELVLIESBUISJES

U hebt in overleg met uw behandelende arts besloten om trommelvliesbuisjes te laten plaatsen bij uw kind. In deze folder vindt u algemene informatie over de ingreep. Misschien zijn niet alle details op uw kind van toepassing. Over andere zal de chirurg u juist meer informatie geven.

Vorbereiding

Geef de chirurg alle informatie over de algemene gezondheidstoestand van uw kind. Vertel ook welke medicatie uw kind regelmatig neemt (in het bijzonder aspirine en aanverwante producten of andere medicatie die de bloedstolling kan beïnvloeden). Had uw kind eerder al allergische reacties, in het bijzonder op medicatie, vermeld dat dan zeker.

Breng recente medische verslagen zoals bloedafnames, radiologische en andere preoperatieve onderzoeken mee.

Vragen over de algemene verdoving - indien van toepassing - bespreekt u het best vooraf met de anesthesist.

Waarom diablo's?

Trommelvliesbuisjes kunnen om twee redenen geplaatst worden:

- ▲ Bij lange of terugkerende episodes van vocht in het middenoor (secretaire otitis media of lijmoor).
- ▲ Bij herhaalde episodes van acute oorontsteking (acute otitis media).


De trommelvliesbuisjes zorgen voor een betere verluchting van het middenoor. Het aantal episodes van middenoorontstekingen vermindert meestal. Als door de middenoorontsteking het gehoor van uw kind is verminderd, zorgen de trommelvliesbuisjes ook voor een verbetering van het gehoor. Dat kan een positieve invloed hebben op het gedrag en de taal- en spraakontwikkeling van uw kind.

Het oor

Het oor bestaat uit drie grote delen:

- ▲ De oorschelp en de uitwendige gehoorgang (1).
- ▲ Het middenoor (6): een met lucht gevulde holte die bestaat uit het trommelvlies (2) en de drie gehoorbeentjes: hamer (3), aambeeld (4) en de stijgbeugel (5). De buis van Eustachius (8) zorgt voor de verluchting van het middenoor.
- ▲ Het binnenoor bestaat uit het slakkenhuis (9) en het evenwichtsorgaan (7).

Geluid komt via de uitwendige gehoorgang tot aan het trommelvlies. De trillingen van het trommelvlies worden via de gehoorbeentjesketen overgebracht naar het slakkenhuis. Informatie uit het slakkenhuis wordt via de gehoorzenuw (10) naar de hersenen geleid.



Technische aspecten van de ingreep

- ▲ We brengen uw kindje in slaap. U mag in de operatiezaal blijven tot het slaapt.
- ▲ Via de gehoorgang maakt de chirurg een kleine snede in het trommelvlies. Het middenoorvocht wordt geaspireerd en het trommelvliesbuisje geplaatst.

- ▲ Er bestaan verschillende soorten diablo's met elk hun specifieke indicaties. De courant geplaatste diablo's worden gemiddeld na zes maanden uitgestoten uit het trommelvlies. In heel zeldzame gevallen moeten ze onder algemene verdoving verwijderd worden.



1. Diabolo / 2. Uitwendige gehoorgang / 3. Trommelvlies / 4. Middenoor (bron: iconet.com)

Na de operatie

Na het advies van de kinderarts en/of anesthesist komen u en uw kind in de namiddag naar de polikliniek Neus-, keel- en oorheelkunde. De NKO-arts controleert de oren van uw kind en u krijgt informatie over de verdere opvolging.

Als uw kind pijn heeft, mag u een pijnstiller geven. De eerste dagen na de ingreep kan uw kind ook wat lichte koorts hebben. U kan dan een koortswerend middel geven. Kinderen kunnen doorgaans de dag na de ingreep terug naar school.

Het is niet ongewoon als uw kind de eerste dagen na de ingreep vocht verliest uit het oortje. Blijft het oortje na enkele dagen lopen, dan maakt u het best zo vlug mogelijk een afspraak op de polikliniek.