

JOUW BEHANDELING MET ENZALUTAMIDE

INHOUD

01	Wat doet dit geneesmiddel?	3
02	Inname	3
03	Pletten / breken	3
04	Combinatie met andere geneesmiddelen	4
05	Bijzondere voorzorgsmaatregelen	4
06	Maatregelen bij een vergeten dosis	4
07	Voornaamste bijwerkingen	5
08	Bewaring	5
09	Waar verkrijgbaar?	5

01 WAT DOET DIT GENEESMIDDEL?

Enzalutamide gebruiken we bij de behandeling van prostaatkanker, die al dan niet is uitgezaaid naar andere plaatsen in het lichaam (vooral klieren en skelet). Het geneesmiddel remt de activiteit van androgenen (zoals testosteron), zodat de prostaatkankercellen niet meer groeien en delen. Androgenen zijn hormonen die zorgen voor de ontwikkeling en het behoud van mannelijke kenmerken.

Enzalutamide is de werkzame stof van het geneesmiddel met merknaam: _____

02 INNAME

Neem elke dag **vier tabletten** enzalutamide in met een glas water, met of zonder eten. Neem de vier tabletten vlak na elkaar in. Doe dat elke dag op **hetzelfde tijdstip**.

In sommige gevallen zijn dosisaanpassingen nodig. Je arts vertelt je welke dosis je moet nemen.

03 PLETTEN / BREKEN

Slik de tabletten altijd in hun geheel door. Kauw niet op de tabletten. Je mag de tabletten niet pletten, breken of oplossen.

04 COMBINATIE MET ANDERE GENEESMIDDELEN

Voor je een behandeling met enzalutamide start, moet je jouw arts of apotheker melden welke andere geneesmiddelen je gebruikt. Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van enzalutamide verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Dat geldt ook voor kruidenmiddelen en geneesmiddelen die je zonder voorschrift kan kopen.

Een medewerker van de Apotheek in het UZ Gent bespreekt met jou je thuismedicatie (eventueel telefonisch). Met die gegevens kijkt een apotheker na of alle medicatie die je neemt kan gecombineerd worden. Mogelijke optimalisaties bespreekt de apotheker met de behandelende arts en als dat relevant is brengen we jou op de hoogte.

05 BIJZONDERE VOORZORGSMATREGELEN

- ▲ Drink geen pompelmoessap tijdens de behandeling met enzalutamide.
- ▲ Neem dit geneesmiddel niet als je in het verleden al epilepsieaanvallen had.
- ▲ Enzalutamide is niet geschikt voor vrouwen. Als je partner zwanger is of zwanger kan worden, moet je een condoom gebruiken.

06 MAATREGELEN BIJ EEN VERGETEN DOSIS

- ▲ Als je vergeet om enzalutamide in te nemen op het juiste tijdstip, neem dan de gebruikelijke dosis van zodra je eraan denkt. Als je een dosis van een hele dag mist, neem dan de volgende dag de gebruikelijke dosis op het juiste tijdstip in.
- ▲ Neem **geen dubbele dosis** om een vergeten dosis in te halen.

07 VOORNAAMSTE BIJWERKINGEN

- ▲ Vermoeidheid
- ▲ Opvliegers
- ▲ Hoge bloeddruk
- ▲ Hoofdpijn
- ▲ Epilepsieaanvallen (beperkt)

Als je een of meer van die bijwerkingen ervaart of als je vragen hebt hierover, neem dan contact op met de verpleegkundig consulent (tel. 09 332 11 79 of 09 332 04 16).

08 BEWARING

Bewaar dit geneesmiddel in zijn oorspronkelijke verpakking op kamertemperatuur, en zeker buiten het bereik van kinderen.

09 WAAR VERKRIJGBAAR?

Dit geneesmiddel is enkel verkrijgbaar op voorschrift in de Apotheek van het ziekenhuis (ingang 12, route 1570). Breng je identiteitskaart mee als je het geneesmiddel komt afhalen. Enzalutamide wordt volledig terugbetaald door de ziekteverzekering.

Openingsuren Apotheek UZ Gent:

- ▲ maandag tot vrijdag: 8-20 uur
- ▲ zaterdag: 8-12 uur en 13-16.30 uur
- ▲ zondag en feestdagen: 8-13 uur

Telefoonnummer Apotheek UZ Gent bij vragen: +32 9 332 32 41

E-mail: apotheek.info@uzgent.be

Wil je deze folder of andere documentatie over jouw behandeling digitaal bekijken?

Je vindt alle info op www.uzgent.be/folders-kankercentrum onder de rubriek 'Urologische oncologie'.
