

Dienst Reumatologie

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

Volg ons op



ARAVA®, LEFLUNOMIDE®



LEFLUNOMIDE

Uw arts schreef leflunomide (merknaam Arava®, Leflunomide®) voor. Dit medicijn wordt gebruikt om gewrichtsklachten te behandelen bij verschillende reumatische aandoeningen.

Werking

Leflunomide (Arava®, Leflunomide®) behoort tot de basis-therapieën bij reumatische aandoeningen. Het geneesmiddel werkt in op het afweersysteem: het remt de gewrichtsontstekingen en doet ze afnemen. Hierdoor vermindert ook de gewrichtspijn en kans op permanente gewrichtsbeschadiging.

Leflunomide (Arava®, Leflunomide®) heeft na 8 à 12 weken effect. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor om deze periode te overbruggen.

Hoe innemen?

Neem leflunomide (Arava®, Leflunomide®) eenmaal per dag in bij de maaltijd. Er bestaan doseringen van 10 mg, 15 mg en 20 mg. Uw arts bespreekt met u welke dosering u moet gebruiken.

Opstart

- ▲ De arts beslist om leflunomide (Arava®, Leflunomide®) voor te schrijven.
- ▲ Uw arts geeft u een ingevuld attest met een aanvraag tot terugbetaling en een voorschrift voor leflunomide (Arava®, Leflunomide®).
- ▲ U bezorgt het terugbetalingsattest aan uw mutualiteit.
- ▲ U haalt het geneesmiddel af bij de apotheek. U hebt daarvoor de goedkeuring van de adviserend geneesheer van uw mutualiteit en het voorschrift nodig.

- ▲ U start de inname van het geneesmiddel.
- ▲ Ongeveer vier weken na de eerste inname gaat u naar uw huisarts voor een bloedafname ter controle van uw beenmerg-, lever- en nierfunctie en ontstekingsparameters.
- ▲ Na ongeveer 6 à 12 weken gaat u op controle bij uw arts om de evolutie te bespreken.
- ▲ Ongeveer 12 weken na de opstart ondergaat u een tweede controlebloedafname. Nadien gebeurt dat om de drie maanden.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen zijn zeldzaam en verbeteren vaak na verloop van tijd. De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- ▲ Misselijkheid
- ▲ Opgeblazen gevoel
- ▲ Buikkrampen
- ▲ Diarree
- ▲ Huiduitslag
- ▲ Verhoogde vatbaarheid voor bepaalde infecties

Bespreek deze bijwerkingen met uw arts. Indien nodig zal past uw arts de behandeling aan.

Sommige bijwerkingen merkt u zelf niet op en moet de arts opvolgen:

- ▲ Verhoogde bloeddruk
- ▲ Gestoorde levertesten
- ▲ Gestoorde beenmergfunctie

Voorzorgsmaatregelen bij een onderhoudsbehandeling

- ▲ Laat uw bloed elke drie maanden controleren zolang u leflunomide (Arava®, Leflunomide®) gebruikt. Zo kunnen we mogelijke schadelijke neveneffecten tijdig ondervangen.

- ▲ U mag niet zwanger worden wanneer u leflunomide (Arava®, Leflunomide®) inneemt. Zorg voor goede anticonceptie. Spreek tijdig met uw arts als u zwanger wil worden.
- ▲ Laat u jaarlijks vaccineren tegen griep en vijfjaarlijks tegen pneumokokken.
- ▲ U mag geen levend vaccin toegediend krijgen (o.a. mazelen, bof, rubella, gele koorts, enz.).
- ▲ Bij ziekte heeft het weinig zin om te stoppen met de behandeling met leflunomide (Arava®, Leflunomide®).
- ▲ Contacteer tijdig uw arts wanneer u een chirurgische ingreep moet ondergaan.