



Dienst Neus-, keel- en oorheelkunde

Ingang 69, route 690

Tel. 09 332 23 32 of
09 332 26 21

Fax 09 332 49 93

nko@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

UZ Gent

Postadres

De Pintelaan 185

Toegang

C. Heymanslaan 10


B 9000 Gent

T: +32 (0)9 332 21 11

info@uzgent.be

www.uzgent.be

volg ons op  

 hoofd, hals en zenuwstelsel
Universitair Ziekenhuis Gent



Ouderdoms- slechthorendheid

Ouderdoms- slechthorendheid

Ouderdomsslechthorendheid treedt op bij het ouder worden. Het gaat gepaard met slechthorendheid in beide oren. De slechthorendheid is het meest uitgesproken in de hoge tonen en neemt toe met de jaren.

Om de diagnose te stellen doen we een objectieve meting van de gehoorschepthe (audiogram). De ernst van het gehoorverlies en het tijdstip waarop iemand er last van krijgt, verschillen van persoon tot persoon. Ouderdomsslechthorendheid komt voor bij tien procent van de 60-jarigen en bij meer dan de helft van de mensen ouder dan 80 jaar. De aandoening komt in het algemeen iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen en het gehoorverlies is ook wat meer uitgesproken bij mannen.


Klachten

Slechthorendheid is een erg hinderlijke handicap, die vele sociale en professionele gevolgen kan hebben. Het probleem wordt sterk onderschat. Slechthorenden kunnen vooral in een lawaaierige omgeving slecht verstaan wat er gezegd wordt. Ze kunnen het geluid wel horen, maar het niet goed onderscheiden: ze horen dat er iets gezegd wordt, maar verstaan niet wat.

Heel vaak is dat de eerste klacht. Verder kunnen mensen met ouderdomsslechthorendheid last hebben van oorsuizen of oorpiepen (tinnitus).

Oorzaken

Het oor bestaat uit drie delen: het uitwendige oor (oorschelp en gehoorgang), het middenoor met de gehoorbeentjes en het binnenoor.



1. binnenoor
2. middenoor
3. gehoorgang
4. oorschelp
5. hamer
6. aambeeld
7. stijgbeugel
8. semicirculaire kanalen
9. trommelvlies

In het middenoor bevinden zich de drie gehoorbeentjes: de hamer, het aambeeld en de stijgbeugel. Het geluid wordt via het trommelvlies, de gehoorbeentjes, het binnenoor en de gehoorzenuw naar de hersenen geleid.

Bij ouderdomsslechthorendheid ligt de oorzaak bij de beschadiging van het binnenoor of het slakkenhuis, meer specifiek de haarcellen (zintuiglijke cellen).

Behandeling

Momenteel is er geen behandeling voor ouderdomsslechthorendheid. Het valt dus niet te verhelpen of verminderen met geneesmiddelen of een operatie. Enkel hoortoestellen brengen soelaas. Hoorapparaten evolueren nog iedere dag en er komen steeds betere apparaten op de markt. Toch moet u er rekening mee houden dat alle hoortoestellen hun beperkingen hebben en dat ze nooit zo goed werken als het normaal horende oor.

Tips

- ✓ Probeer te liplezen
- ✓ Vraag uw gesprekspartner om niet te luid en niet te vlug te spreken en goed te articuleren.
- ✓ Vermijd tegenlicht en achtergrondlawaaai
- ✓ Niet begrepen? Vraag uw gesprekspartner om even te herhalen.