

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

www.uzgent.be

uw.: Frank Vermassen, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent - oktober 2025 - Versie 02 - Art. 030066

BIJ KINDEREN

PROVOCATIETESTEN BIJ KINDEREN

Wat is een provocatietest?

Je kind heeft in het verleden vermoedelijk een allergische reactie gehad op medicatie of voeding. Om de oorzaak te achterhalen voerden we al huidtesten en/of bloedtesten uit. Deze onderzoeken gaven te weinig informatie om te achterhalen of je kind allergisch is voor de medicatie of voeding die onderzocht werd. Daarom stellen we voor om een provocatietest uit te voeren. Je kind krijgt dan het geneesmiddel (of een variant) of voedingsmiddel toegediend waarvoor het allergisch zou kunnen zijn. We starten met een zeer lage dosis en bouwen geleidelijk op tot een normale dagdosis.

Risico's

Tijdens de provocatietest kan een allergische reactie optreden, met mogelijks volgende symptomen:

- ▲ Huiduitslag, jeuk
- ▲ Jeukende neus, neusloop, tranende ogen
- ▲ Misselijkheid, braken, buikpijn, diarree
- ▲ Zwelling tong en keel, moeilijk slikken of praten
- ▲ Moeilijke en/of piepende ademhaling, hoesten
- ▲ Verlaagde bloeddruk
- ▲ Bewustzijnsverlies

De reacties zijn doorgaans licht tot matig. Toch kan ook een ernstige allergische reactie optreden die zelfs levensbedreigend kan zijn. Daarom voeren we de test uit in het dagziekenhuis, waar we je kind goed in de gaten kunnen houden, en nemen we een aantal voorzorgen:

- ▲ De verpleegkundige plaatst een waakinfluus.
- ▲ Je kind wordt aangesloten op een monitor.
- ▲ Op vaste momenten controleren we de bloeddruk en pols van je kind. Als er geen allergische symptomen optreden, dienen we een hogere dosis van het geneesmiddel of het voedingsmiddel toe.

Praktisch

De provocatietest voor je kind staat gepland op donderdag

_____ / _____ / _____

We verwachten je om 9 uur in het dagziekenhuis Kinder-geneeskunde (ingang 10, route 1005).

Als alles vlot verloopt, kunnen jij en je kind twee uur na het einde van de test naar huis (meestal rond 15 à 16 uur). Als je kind een allergische reactie heeft, blijft het in observatie tot de reactie volledig verdwenen is. Dit kan tot 24 uur duren. Hou hier rekening mee als je een afspraak voor de testen vastlegt.

Belangrijk

- ▲ Sommige geneesmiddelen kunnen de resultaten van de testen beïnvloeden. Je kind mag vijf dagen voor de test geen antihistaminica meer innemen. Bloeddrukverlagende medicatie moet twee dagen voor de test stopgezet worden.
- ▲ Breng je arts op de hoogte bij het vastleggen van de afspraak als je kind een van de volgende geneesmiddelen neemt:
 - Antihistaminica (Zyrtec®, Cetirizine®, Xyzall®, Alerius®, Claritine®, Loratadine®, Estivan®, Fenistil®, enz.)
 - Corticoïden (Medrol®)
 - Bloeddrukverlagende geneesmiddelen
- ▲ De testen worden niet uitgevoerd als je kind een acute infectie doormaakt (bv. griep, keelontsteking, huidinfectie).
- ▲ Je kind mag voor de test een licht ontbijt eten: één cracker of boterham met zoet beleg en heldere vloeistof (water, thee, appelsap).
- ▲ Tijdens de provocatietest mag je kind enkel water drinken. Als we twee uur na de laatste toediening geen allergische symptomen hebben vastgesteld, mag je kind eten. We voorzien standaard sandwiches.
- ▲ Voor een provocatietest met voeding moet je de ingrediënten zelf meebrengen (wat je precies meebrengt, spreek je af met de behandelende arts).

- ▲ Er kan een lokale verdovende zalf aangebracht worden ter hoogte van de aanprikplaats voor het waakinfluus. Deze zalf moet minstens 45 minuten inwerken. Je kan deze zalf thuis aanbrengen of wat vroeger naar het dagziekenhuis komen. Als je de zalf thuis wil aanbrengen, bespreek dat dan op voorhand met de arts. Je krijgt dan ook een voorschrift en een foldertje over het gebruik van Emla®-crème.
- ▲ Je kind blijft een groot deel van de dag in bed, kies daarom voor comfortabele kledij. Breng ook verzorgingsproducten en de thuismedicatie van je kind mee.
- ▲ Je kan de hele tijd bij je kind blijven.
- ▲ Dit breng je mee op de dag van de provocatietest:

Contact

Vragen?

Bel allergieverpleegkundige Liesbet De Groote, tel. 09 332 07 08.

Of neem contact op met het dagziekenhuis Kinder-geneeskunde, tel. 09 332 37 72. Vraag naar de verantwoordelijke artsen:

- ▲ Dr. Mariska De Lausnay en dr. Julie Willekens (geneesmiddelen en alg. supervisie)
- ▲ Prof. Hilde Lapeere en dr. Julie Ossieur (voeding)