

Dienst Neurologie

Ingang 12, route 1525
T +32 (0)9 332 45 29
neurologie@uzgent.be

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden veeelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



RITUXIMAB

(MABTHERA®)



RITUXIMAB (MABTHERA®)

Uw neuroloog heeft u rituximab voorgeschreven. Om dit medicijn goed te kunnen gebruiken, is het belangrijk dat u er een aantal dingen over weet. Deze folder geeft algemene informatie over rituximab en vervangt de bijsluiter niet.

Wat is rituximab ?

Rituximab is een geneesmiddel dat intraveneus wordt toegediend om het immuunsysteem te temperen bij auto-immune neurologische aandoeningen, zoals multiple sclerose, NMO, Susac's syndroom en andere aandoeningen. Meer specifiek onderdrukt het de zogenaamde B-cellen.

Combinatie met andere geneesmiddelen

U kunt rituximab in combinatie met bijna alle geneesmiddelen gebruiken. Vertel uw huisarts en specialist daarom altijd welke geneesmiddelen u gebruikt en vraag advies bij nieuwe medicatie.

Hoe innemen

Rituximab wordt in 2 dosissen met twee weken tussen toegediend. Meestal wordt het zesmaandelijks herhaald. Minder frequente of lagere dosering is op termijn vaak mogelijk.

Mogelijke bijwerkingen

In de bijsluiter van de apotheek staan alle bijwerkingen van rituximab die ooit zijn voorgekomen.

De meest voorkomende zijn:

Infuusgerelateerde reacties: jeuk, kortademigheid, koorts, rillingen, huiduitslag en/of bloeddrukschommelingen. Om de kans op bijwerkingen te verkleinen, worden vóór elk infuus, een anti-allergiemiddel en medrol toegediend.

In sommige gevallen:

- ▲ Er is een mild verhoogde kans op infecties vooral bij langdurige toediening.
- ▲ Bij het gebruik bij reumatologische en oncologische aandoeningen is er een verhoogde kans op ernstige herseninfecties (zogenaamde PML). Tot vandaag lijkt dat niet voor te komen bij patiënten behandeld voor neurologische aandoeningen.

Neem onmiddellijk contact op met uw specialist of huisarts bij:

- ▲ Tekens van ernstige infecties
- ▲ Aanhoudende allergische klachten
- ▲ Nieuwe neurologische klachten

Hebt u veel last van bijwerkingen, neem dan contact op met uw neuroloog.

Controles

Er is vooraf altijd een bloedafname nodig om na te kijken of de bloedvorming en antilichaamproductie normaal zijn en er geen infecties zijn. Tuberculose moet voor de opstart uitgesloten te worden.

Om eventuele stoornissen in de werking van de aanmaak van het bloed en antistoffen in een vroeg stadium te ontdekken, laat uw specialist regelmatig uw bloed onderzoeken bij elke opname. Soms vinden er ook eerder controles plaats om na te gaan of de B-cellen goed onderdrukt blijven.

Effect op vruchtbaarheid, zwangerschap en borstvoeding

De risico's van de behandeling met rituximab tijdens de zwangerschap zijn onduidelijk. Overleg steeds eventuele zwangerschapsplanning met uw neuroloog. Vermijd borstvoeding bij de inname van Rituximab.

Vaccinaties

U mag niet alle vaccinaties krijgen tijdens het gebruik van deze medicatie. Overleg daarom altijd met uw specialist als u een vaccinatie nodig hebt. De griep prik is veilig en wordt ook aangeraden door uw specialist.

Meer informatie

Contacteer uw huisarts of uw behandelend neuroloog (09 332 45 29) bij bijkomende vragen of bij neven-effecten/klachten.

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijsluiter. U vindt ook onafhankelijke informatie over geneesmiddelen op de website van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische informatie www.bcfi.be.