



SULFASALAZINE

SALAZOPYRINE®

Dienst Reumatologie

Ingang 74, route 740
T +32 (0)9 332 22 52

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



SULFASALAZINE

Uw arts schreef sulfasalazine (merknaam (Salazopyrine®) voor. Dit medicijn wordt gebruikt om gewrichtsklachten te behandelen bij verschillende reumatische aandoeningen.

Werking

Sulfasalazine (Salazopyrine®) behoort tot de basistherapieën bij reumatische aandoeningen. Het geneesmiddel werkt in op het afweersysteem: het remt de gewrichtsontstekingen en doet ze afnemen. Hierdoor vermindert ook de gewrichtspijn en kans op permanente gewrichtsbeschadiging.

Sulfasalazine (Salazopyrine®) heeft na 4 tot 10 weken effect. Mogelijk schrijft uw arts een ander medicijn voor om deze periode te overbruggen.

Hoe innemen?

Sulfasalazine (Salazopyrine®) wordt meestal toegediend in twee of drie keer toegediend (afhankelijk van de dosering). Uw arts bespreekt met u welke dosering u moet gebruiken.

Opstart

- ▲ De arts beslist om sulfasalazine (Salazopyrine®) voor te schrijven.
- ▲ Uw arts geeft u een voorschrift om het geneesmiddel af te halen bij uw apotheek.
- ▲ Er is geen terugbetalingsattest nodig voor sulfasalazine (Salazopyrine®).
- ▲ U start de inname van het geneesmiddel.
- ▲ Ongeveer zes weken na de eerste inname gaat u naar uw huisarts voor een bloedafname ter controle van uw beenmerg-, lever- en nierfunctie en ontstekingsparameters.

- ▲ Na ongeveer 6 tot 12 weken komt u op controle bij uw arts om de evolutie van de behandeling te bespreken.
- ▲ Ongeveer twaalf weken na de opstart ondergaat u een tweede controlebloedafname. Nadien gebeurt dat om de drie maanden.

Mogelijke bijwerkingen

Bijwerkingen zijn zeldzaam.

De meest voorkomende bijwerkingen zijn:

- ▲ Misselijkheid
- ▲ Verminderde eetlust
- ▲ Hoofdpijn
- ▲ Huiduitslag

Sommige bijwerkingen merkt u zelf niet op en moet de arts opvolgen:

- ▲ Gestoorde levertesten
- ▲ Gestoorde beenmergfunctie

Mannen kunnen tijdelijk minder vruchtbaar zijn als ze dit geneesmiddel gebruiken. Na stopzetting van dit geneesmiddel is deze bijwerking volledig omkeerbaar. Stel uw vragen aan uw arts.

Spreek uw arts aan als u last hebt van bijwerkingen.

Voorzorgsmaatregelen bij een onderhoudsbehandeling

Laat uw bloed elke drie maanden controleren zolang u sulfasalazine (Salazopyrine®) gebruikt. Zo kunnen we mogelijke schadelijke neveneffecten tijdig ondervangen.