

UW BEHANDELING MET VIDAZA®

KANKERCENTRUM



WAT VINDT U TERUG IN DEZE BROCHURE

01	Wat is Vidaza?®	3
02	Vorbereiding en verloop van de behandeling	3
03	Overzicht van de behandeling	4
04	Onderzoeken	5
05	Medicatie	5
06	Bijwerkingen	6

01 WAT IS VIDAZA®

Vidaza® bevat de actieve stof Azacitidine, deze heeft een toxische werking op abnormale cellen. Het dringt door tot in de kern van deze cellen en werkt in op hun DNA. Deze actie zal leiden tot een verhoogde expressie van bepaalde genen. Op die manier zal de groei van tumorale cellen worden tegengehouden en de ontwikkeling van normale bloedcellen worden bevorderd.

Generische naam	Vb. specialiteitsnaam	Specifieke werking
Azacitidine	Vidaza®	Antineoplastische werking

02 VOORBEREIDING EN VERLOOP VAN DE BEHANDELING

Deze behandeling wordt op het dagziekenhuis (ingang 12, route 1323) toegediend. In uitzonderlijke gevallen kan uw arts beslissen om uw behandeling te geven tijdens een opname op de hospitalisatieafdeling (ingang 12, route 1467 of 1416).

Bij een opname op het dagziekenhuis komt u steeds terecht op een 2-persoonskamer. U hoeft vooraf niet nuchter te zijn, een lichte maaltijd die dag kan zelfs aangewezen zijn om misselijkheid te voorkomen.

Voor de start van elke kuur, op dag 1, wordt een bloedafname uitgevoerd. Afhankelijk van de resultaten kan de therapie opgestart, maar ook uitgesteld worden naar een later moment (dit in overleg met uw arts). Deze bloedafname zal tijdens uw kuur enkele keren worden herhaald, om na te kijken of u al dan niet transfusie nodig heeft.

Vidaza® zal dagelijks worden toegediend via 2 onderhuidse inspuitingen in de buik of de bil. De eerste 5 toedieningen zullen plaatsvinden van maandag tot vrijdag, de 6^{de} en 7^{de} inspuitingen zullen worden toegediend op maandag en dinsdag van de tweede week van uw cyclus.

Na deze 7 toedieningen volgt een rustperiode, zoals hieronder schematisch staat weergegeven. Eén cyclus duurt 28 dagen.

Voor de start krijgt u premedicatie toegediend om mogelijke bijwerkingen te voorkomen.

Indien Vidaza® in studieverband wordt toegediend kan, in overleg met uw behandelend arts, afgeweken worden van het standaard behandelplan.

03 OVERZICHT VAN DE BEHANDELING

	Product	Toediening	DAG 1	DAG 2	DAG 3	DAG 4	DAG 5	DAG 6	DAG 7
WEEK 1	Vidaza®	SC ¹	X	X	X	X	X		

	Product	Toediening	DAG 8	DAG 9	DAG 10	DAG 11	DAG 12	DAG 13	DAG 14
WEEK 2	Vidaza®	SC	X	X	RUSTPERIODE				

	DAG 15	DAG 16	DAG 17	DAG 18	DAG 19	DAG 20	DAG 21
WEEK 3	RUSTPERIODE						

	DAG 22	DAG 23	DAG 24	DAG 25	DAG 26	DAG 27	DAG 28
WEEK 4	RUSTPERIODE						

¹ SUBCUTAAN (ONDERHUIDS)

04 ONDERZOEKEN

De arts bepaalt wanneer er een tussentijdse evaluatie zal plaatsvinden, dit kan na 4, 6, 9 en 12 cycli. Enkele frequent voorkomende onderzoeken zijn:

- Een bloedonderzoek
- Een beenmergonderzoek (bij evaluatie van effect therapie)

05 MEDICATIE



Informeer steeds uw behandelende arts over alle geneesmiddelen die u gebruikt! **(zowel de geneesmiddelen die worden voorgeschreven, als de (genees)middelen die u zonder voorschrift gebruikt (bv. kruidenpreparaten of vitamines)**

06 BIJWERKINGEN

Volgende bijwerkingen kunt u ervaren

- Beenmergonderdrukking: de bloedvormende functie kan mogelijks in het gedrang komen. Hierdoor kan het aantal rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes fors dalen. Dit kan bloedarmoede tot gevolg hebben, maar ook een verhoogde gevoeligheid voor infecties en een verhoogde bloedingsneiging.
- Misselijkheid en braken
- Diarree
- Lokale huidreactie (roodheid, zwelling, pijn) op de plaats waar de Vidaza® werd toegediend.

!

Hoe u deze nevenwerkingen beleeft, is zeer individueel en persoonlijk! Iedereen reageert anders op de toediening.

Sommige mensen hebben veel last van bijwerkingen, anderen hebben er minder last van. Belangrijk hierbij is dat de ernst van de bijwerkingen niets te maken heeft met het resultaat van de behandeling!

Het is belangrijk dat u steeds uw bijwerkingen vermeldt aan uw arts of verpleegkundige bij een volgend ziekenhuisbezoek. Op die manier kunnen er mogelijkheden gezocht worden om deze bijwerkingen te voorkomen of te verminderen.