

Gezichtsstoornissen? Geen paniek!

Het is mogelijk dat u na inname van voriconazole gezichtsstoornissen hebt, zoals wazig zien.


Er kunnen ook kleurveranderingen optreden.

Dit is niet gevaarlijk. De bijwerkingen verdwijnen meestal snel vanzelf.

Hebt u gezichtsstoornissen? Verwittig dan uw arts, rij niet met een voertuig of gebruik geen gevaarlijke machines of apparaten.

Bewaring

- ▲ Bewaar dit geneesmiddel buiten het zicht en bereik van kinderen.
- ▲ Bewaar tabletten op een droge plaats bij kamertemperatuur.
- ▲ Siroop:
 - Niet opgelost: bewaren in koelkast (2°C-8°C) tot vervaldatum.
 - Opgelost: bewaren op kamertemperatuur (<30°C), niet in koelkast of vriezer. Maximaal 14dagen houdbaar na oplossen.



Waar te verkrijgen?

Dit geneesmiddel is attestplichtig en enkel met een voorschrift verkrijgbaar in de apotheek. Het is belangrijk om steeds voriconazole van hetzelfde merk in te nemen.

vu.: Eric Mortier, gedelegeerd bestuurder UZ Gent, C. Heymanslaan 10, 9000 Gent – Juni 2023 – Versie 02 – Art. 090020

Apotheek

Ingang 12, route 1570

T +32 (0)9 332 29 60

Deze brochure werd enkel ontwikkeld voor gebruik binnen het UZ Gent. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent
C. Heymanslaan 10 | B 9000 Gent
T +32 (0)9 332 21 11 | E info@uzgent.be

www.uzgent.be

Volg ons op



VORICONAZOLE

VORICONAZOLE

Wat doet dit geneesmiddel?

Voriconazole wordt gebruikt voor de behandeling van ernstige schimmelinfecties.

Inname

Het is zeer belangrijk dat u de tabletten of de siroop na ontslag uit het ziekenhuis verder inneemt zoals uw arts het voorschreef. De dosis kan tijdens de behandeling aangepast worden op basis van het voriconazolegehalte in uw bloed.

Neem de voorgeschreven dosis:

- ▲ 2 maal per dag
- ▲ steeds op dezelfde tijdstippen
- ▲ met 12 uur tussentijd
- ▲ niet bij de maaltijd
- ▲ tabletten: minstens 1 uur vóór of 1 uur na de maaltijd




om u en u

Dosis op / /:


..... x 50 mg  x 200 mg 

▲ siroop: minstens 1 uur vóór of 2 uur na de maaltijd



om u en u

Dosis op / /:

..... mg = ml 

Stop de behandeling nooit op eigen houtje.

Vergeten dosis


Een vergeten dosis kunt u tot maximum 2 uur na het normale inname-tijdstip innemen. Respecteer dan ook steeds voldoende tijd tussen de inname en de maaltijd. Neem de volgende dosis in op het normale tijdstip.

Bepaling van het voriconazolegehalte in het bloed

Uw arts zal regelmatig de voriconazolespiegel in uw bloed controleren. De bloedafname gebeurt altijd 30 minuten voor u de medicatie inneemt, dus 11,5 uur na de vorige inname. U kunt die dag de medicatie naar het ziekenhuis meebrengen en na de bloedafname innemen.

Combinatie met andere geneesmiddelen

Bepaalde geneesmiddelen, voedingssupplementen (bv. Sint-Janskruid) of voeding (bv. pomelmoessap) kunnen de werking van voriconazole verminderen of verhogen de kans op bijwerkingen. Meld aan uw arts of apotheker steeds alle medicatie, voedings- en kruidensupplementen die u inneemt of wil innemen. Ook producten die u zonder voorschrift kunt krijgen of koopt in de drogisterij.



Meld steeds aan andere zorgverleners dat u een behandeling met voriconazole volgt.

Opgelet voor de zon!

Voriconazole maakt de huid gevoelig voor de zon. U kunt dus sneller verbranden. Vermijd daarom zonlicht en blootstelling aan de zon.

- ▲ Bescherm uw huid zoveel mogelijk met aangepaste kledij.
- ▲ Smeer blootgestelde delen zoals uw gezicht, uw oren, uw handen en voeten dagelijks in met een zonnebrandcrème SPF50+

